

A finales de abril y principios de mayo – tiempo inestable con riesgo de formación de heladas y daños a los cultivos agrícolas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 29.04.2024 Брой: 4/2024



Durante el próximo período de siete días, los procesos de vegetación de los cultivos agrícolas procederán a ritmos moderados con temperaturas diarias promedio alrededor de las normas climáticas. Las lluvias económicamente significativas durante el tercer decenio de abril en las regiones de campo del país mejoraron las condiciones para las fases iniciales de desarrollo del maíz y el girasol y para la vegetación de los cereales de invierno.

En algunos lugares de Plovdiv, Stara Zagora y Sliven, se produjeron granizadas que destruyeron gran parte de la cosecha. Todas las plantaciones de rosas en el pueblo de Banya, Sliven, fueron destruidas por el granizo, y los viñedos también se vieron afectados.

Durante el período para el trigo y la cebada, se producirán las siguientes fases: elongación del tallo en algunos de los cultivos en la mitad occidental del país y la parte central de la llanura del Danubio; transición a la espigazón y espigazón en algunas áreas del este y sur de Bulgaria – agroestaciones Targovishte, Silistra, Karnobat, Kazanlak, Plovdiv y Pazardzhik. Para el maíz y el girasol, se producirán la emergencia y el inicio de la formación de hojas, dependiendo de las fechas de siembra.

Para las vides, se observará la formación de hojas (1-3 hojas) y la separación de racimos.

Para los cereales de invierno durante las fases de elongación del tallo y espigazón, los daños a las plantas son causados por el escarabajo de la hoja de cereal común y el chinche de los cereales. Los cultivos también deben ser inspeccionados para detectar el desarrollo de oídio.

Para las especies frutales, después de la floración, continúan los tratamientos contra la monilia temprana en frutas de hueso, la sarna y el oídio en frutas de pepita. Para las vides, las pulverizaciones fitosanitarias tienen como objetivo proteger el cultivo del mildiu y el oídio, y de la actividad dañina del ácaro amarillo de la vid.

El pronóstico de tiempo inestable con lluvias limitará temporalmente las posibilidades de realizar actividades agrotécnicas. Al comienzo del período, en las llanuras altas del oeste de Bulgaria, persiste la probabilidad de formación de heladas y daños a los cultivos agrícolas.

Fuente NIMH