


Durante la tercera década de mayo, para los cereales de invierno bien provistos de humedad, ocurrirá la formación y el llenado del grano.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 23.05.2024 Брой: 5/2024



Tras el tiempo fresco para la estación a mediados de mayo, durante el tercer decenio del mes, se pronostica un aumento significativo de las temperaturas, la normalización de las condiciones térmicas y la activación de los procesos de vegetación en los cultivos agrícolas.

Las precipitaciones esperadas a finales del segundo y principios del tercer decenio en la mayoría de las regiones de campo mantendrán las reservas de humedad del suelo dentro de los límites óptimos en la capa de 50 y 100 cm, más del 85% de CC. Durante el período, para los cultivos de cereales de invierno bien provistos

de humedad, se producirá la formación y el llenado del grano. En las regiones del sureste (agroestación de Karnobat), para la cebada, antes de lo habitual, también se observará la fase de madurez lechosa.

La formación de hojas se producirá en el maíz y el girasol. Al final del período, para el girasol sembrado dentro del período agrotécnico, también se observará el inicio de la formación de la inflorescencia.

El pronóstico de tiempo inestable con lluvias frecuentes durante el próximo período mantendrá un fondo infeccioso aumentado de patógenos fúngicos: podredumbre parda tardía en frutos maduros de variedades tempranas de cereza, moho gris en fresas, mildiu en vides y cultivos hortícolas, sarna en especies de frutas de pepita, etc.



Mosca de la cereza

Durante el tercer decenio de mayo, la mosca de la cereza causa daños a las variedades de cereza de media estación. Para limitar los daños de esta plaga, se recomienda el tratamiento al inicio de la fase de maduración del fruto (cuando los frutos de cereza empiezan a ponerse ligeramente rosados) con un insecticida con un período de carencia corto.

En los viñedos, se deben continuar los muestreos para detectar la presencia y actividad dañina de las larvas de la primera generación de la polilla del racimo, y en los cultivos frutales, para la carpocapsa, la polilla de la

ciruela y la polilla oriental de la fruta.

Durante el período, el aumento del contenido de humedad en las capas superiores del suelo limitará el laboreo estacional del suelo y la lucha contra la vegetación adventicia competitiva.

Fuente NIMH