

Junio – desde tiempo inestable con precipitaciones hasta condiciones de calor superiores a lo normal

Автор(и): Растителна защита

Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



En junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable con precipitaciones, alrededor y por encima de la norma mensual, lo que mantendrá buenas y muy buenas reservas de humedad en la capa de suelo de 50cm y 100cm – más del 75-80% de CC (Capacidad de Campo). Se pronostican niveles más bajos de reservas de humedad del suelo en algunas zonas de las regiones extremas nororiental y sudoccidental (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), donde las lluvias de mayo estuvieron por debajo de la norma mensual.

A principios de junio, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá a un ritmo acelerado, bajo condiciones térmicas superiores a lo normal. Debido a las altas temperaturas durante la vegetación primaveral del trigo y la cebada, completarán su desarrollo antes de lo habitual. Durante los primeros diez días de junio, se observará la madurez cerosa masiva para la cebada en las zonas de campo, y al final del período de diez días, la madurez completa. Para el trigo durante este período, se producirá la madurez lechosa, de transición a cerosa y cerosa.

Durante la mayoría de los días del segundo decenio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas cercanas a las habituales para el período. A mediados del decenio, los cultivos de cereales de invierno en campos elevados entrarán en la fase de maduración. Para el maíz, se producirá la formación de hojas, y para los girasoles, prevalecerá la formación de inflorescencias.

Durante la mayor parte del período del 7 al 13 de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima cálido con probabilidad de precipitaciones locales y granizo. Las temperaturas máximas superarán los 30°C durante todo el período, alcanzando los 38°C en la Llanura Tracia, lo que es un requisito previo para el estrés por calor y el deterioro de las condiciones para el desarrollo normal de las plantas cultivadas en sus etapas vegetativas y generativas.

A principios del segundo decenio de junio, se producirá la formación de hojas para el maíz; para los girasoles sembrados dentro del plazo agrícola óptimo, la formación de inflorescencias; para los cultivos leguminosos (judías, soja), la brotación y floración. Para la cebada en las zonas de campo, prevalecerá la madurez cerosa. Para el trigo, se producirá la madurez lechosa y cerosa masiva. Para la colza, se observará la fase de maduración.

Las condiciones térmicas pronosticadas por encima de lo normal durante el tercer decenio de junio acelerarán la vegetación de los cultivos de primavera, y algunos de ellos entrarán en fases reproductivas de su desarrollo. Para los cultivos de girasol sembrados dentro del plazo agrícola óptimo, se observará el inicio de la fase de floración, y para los híbridos de maíz más tempranos, la aparición de la espiga y la caída de las anteras. Durante este período, se pronostican temperaturas máximas de hasta 35-36°C, lo que afectará negativamente la floración y fertilización en los cultivos de hortalizas.

En junio, las frecuentes lluvias pronosticadas son un requisito previo para el desarrollo de enfermedades fúngicas: podredumbre parda tardía, sarna y oídio en árboles frutales; tizones en cultivos de hortalizas; mildiu, oídio y botritis en viñedos. Se crearán condiciones más adecuadas para realizar pulverizaciones de protección fitosanitaria durante la segunda mitad del mes.

! Las altas temperaturas y la baja humedad atmosférica limitarán las posibilidades de llevar a cabo medidas fitosanitarias y dificultarán el trabajo de campo.

Fuente NIMH