

Julio – clima seco y caluroso, lo que conducirá a un acortamiento de los períodos interfásicos en los cultivos agrícolas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.07.2024 *Брой:* 7/2024



Durante la primera mitad de la primera decena del mes, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable. Las precipitaciones previstas en muchos lugares de las zonas de campo del país mejorarán temporalmente las condiciones para el curso de los procesos vegetativos en los cultivos de primavera.

Durante la mayoría de los días de la segunda y tercera decena de julio, se espera un tiempo relativamente seco y caluroso, lo que conducirá a un acortamiento de los períodos interfásicos. Un factor limitante para el desarrollo del maíz y el girasol será el déficit de humedad del suelo. En el maíz, se observarán varias etapas: espigado, floración de la espiga y emisión de los estigmas. A finales de mes, se observará el inicio de la madurez lechosa en los híbridos de maíz temprano. En el girasol, tendrán lugar la floración, la fecundación y el llenado de la semilla. Los valores máximos de temperatura previstos, entre 35 y 40°C, tendrán un impacto negativo en los cultivos durante la etapa reproductiva.



Las altas temperaturas previstas para julio y el tiempo relativamente seco limitarán el desarrollo de enfermedades fúngicas en los cultivos agrícolas, con la excepción de los *oidios* en cultivos perennes y hortícolas. Las precipitaciones previstas, en torno o por debajo de la norma mensual, requerirán la aplicación de un régimen de riego aumentado.



Las condiciones más adecuadas para realizar tratamientos fitosanitarios (contra la segunda generación de gusanos de la fruta en frutales, contra la araña amarilla de la vid en viñedos) se darán durante la segunda mitad de la primera decena, la mayoría de los días de la segunda decena y a finales de mes. Los tratamientos deben realizarse durante las horas más frescas del día.

En las regiones occidentales del país, se mantiene elevada la probabilidad de fenómenos locales intensos y granizadas, y de que se produzcan daños en los cultivos agrícolas: encamado de las parcelas de cereales y desgrane, lesiones mecánicas en los cultivos de primavera, y en la producción hortofrutícola. La cosecha del trigo en gran parte de las zonas de campo del país se desarrollará en condiciones de un riesgo elevado de incendios.

Fuente: NIMH