

Actividades de protección vegetal en el huerto en agosto

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



Con la excepción del oídio en manzano y melocotonero, el riesgo de enfermedades fúngicas ha pasado casi por completo. Los daños causados por insectos y ácaros nocivos también se reducen en gran medida, porque las hojas viejas no son adecuadas para su desarrollo. Además, algunos de ellos pasan a sus huéspedes intermedios.

Las actividades de protección vegetal en agosto están dirigidas principalmente a proteger la cosecha de fruta de la infestación de gusanos y las hojas de las polillas minadoras, chinches y otras plagas que desarrollan varias generaciones.

Los tratamientos deben cumplir con los plazos de seguridad de los plaguicidas y el momento de la cosecha. Deben realizarse durante las horas más frescas del día.

En huertos frutales

En los puntos de manipulación, se inspeccionan los frutos del melocotonero para detectar la presencia de la polilla oriental en áreas no infestadas.

Se monitorean todas las plantaciones para detectar la presencia del gusano de otoño. Cuando se supera el umbral económico de daño, los cultivos se tratan con Dipel 2 X (100 g/ha).



Barrenador de la fruta

Los huertos infestados por el barrenador de la fruta se pulverizan con uno de los productos – Delegate 250 WG (30 g/ha), Rapax 100-200 (ml/ha), Dipel DF 50-150 (g/ha), Avant 150 EC (33.3 ml/ha), Decis 100 EC (8.75-12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (16-30 ml/ha). Para la confusión sexual también se pueden usar difusores de feromonas combinados – Isomate – CLR (100 pcs/ha).

Los troncos y ramas gruesas de los frutales infestados por barrenillos se tratan con uno de los productos – Decis 100 EC (12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0.03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).

Los huertos de melocotonero se pulverizan con uno de los productos – Sulfur WG (600 g/ha), Solfo 80 WG (750 g/ha), Systhane 20 EW (0.03%), Luna Experience (50-75 ml/ha), Flint Max 75 WG (0.02%) contra el oídio; con un producto a base de deltametrina – Decis 100 EC (12.5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Dekka EC (50 ml/ha) contra la polilla oriental, Anarsia (segunda generación), piojo blanco del moral, piojo de San José (en las áreas de distribución); y con Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) u otro producto a base de abamectina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) contra los ácaros.

Se recogen y destruyen los frutos caídos de avellano con gusanos.

Los huertos de manzano se tratan con un insecticida piretroide – Decis 100 EC (7.5-12.5 ml/ha), Sumicidin 5 EC (0.02%), Afikar 100 EC (15 ml/ha), Efcymerin 10 EC (15 ml/ha) y uno de los productos – Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) u otro producto a base de abamectina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) respectivamente contra la polilla minadora serpentina y los ácaros.



Chinche del peral

Los huertos de peral fuertemente infestados por el psílido del peral y la chinche del peral se pulverizan con un insecticida a base de deltametrina – Decis 100 EC (12.5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Dekka EC (50 ml/ha). Esta pulverización también es eficaz contra la carpocapsa en peral.

Los castaños se pulverizan contra el gorgojo del castaño con Coragen 20 SC (18-30 ml/ha).

En plantaciones de fresa



Ácaro de la fresa

Las plantaciones de fresa infestadas por el ácaro de la fresa se tratan con uno de los productos – Voliam Targo 063 SC (80 ml/ha), Laota, Bermektin, Valmek (15-100 ml/ha), Sulfur WG (500-700 g/ha), Heliosulfur C (150-750 ml/ha).

Se inspecciona el material de plantación de fresa destinado a plantarse en agosto. Cuando se detectan el ácaro de la fresa y otras plagas, se desinfecta.

En plantaciones de grosella negra



Medidora de la grosella negra

Las plantaciones infestadas por la medidora de la grosella negra se pulverizan con insecticidas de contacto de todos los grupos. Se puede usar uno de los productos – Decis 100 EC (12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0.03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).