

Septiembre – las condiciones permitirán la formación de rendimiento adicional de los cultivos de hortalizas tardías

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Durante la mayoría de los días de la primera decena de septiembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas, lo que acelerará la culminación de las etapas finales de desarrollo de los cultivos tardíos de campo. En los híbridos de maíz tardío, se observarán las etapas de madurez cerosa y madurez plena. Durante la primera mitad del período, en las regiones orientales se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones, así como una mejora de la humedad del suelo en las capas superiores y de las condiciones para realizar la labranza previa a la siembra. En el resto de

las áreas de campo del país, las condiciones permitirán la liberación de tierras de las cosechas maduras de girasol y maíz.

Durante la segunda decena del mes, se espera un cambio en las condiciones agrometeorológicas. Para la mayoría de los días del período, se pronostica un descenso relativo de las temperaturas, junto con condiciones para precipitaciones en más lugares de las regiones de campo. Las precipitaciones esperadas, tras la sequía intensificada a finales del verano, mejorarán el estado de las capas superiores del suelo y las condiciones para una labranza previa a la siembra y una siembra de colza de invierno de mayor calidad. El marco de tiempo agrotécnico óptimo para la siembra de colza es hasta el final de la segunda decena de septiembre.

Las precipitaciones pronosticadas durante la segunda y la primera mitad de la tercera decena aumentarán el riesgo de desarrollo de patógenos fúngicos en la producción de frutas y hortalizas en maduración: moho gris en la vid, podredumbre parda tardía en los frutos de variedades tardías de árboles frutales, mildius en los cultivos de hortalizas.



Gusano del algodonero

En septiembre, para los cultivos de hortalizas de producción tardía de campo, no se debe subestimar la pulverización de protección de plantas contra las orugas de la tercera generación del gusano del algodonero, ya que causan daños y deterioran la calidad de la cosecha de hortalizas.

Durante la segunda mitad de la tercera decena, se espera tiempo seco y condiciones favorables para la cosecha de la uva madura.

En septiembre, no se pronostican temperaturas mínimas críticas, y las condiciones permitirán la formación de producción adicional a partir de cultivos de hortalizas tardíos.

Fuente: NIMH