

'Sembrado retrasado de colza de invierno y condiciones para infecciones y desarrollo de patógenos en cultivos agrícolas tardíos'

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



Tras la prolongada sequía, a principios de septiembre se registraron precipitaciones económicamente significativas de más de 30–40 l/m² en muchas partes del país (Silistra, Varna, Dobrich, Stara Zagora, Burgas, Haskovo, Sandanski).

Estas precipitaciones llegaron tarde incluso para los cultivos de campo tardíos, que, como resultado del déficit de humedad del suelo y las temperaturas estivales superiores a lo normal, completaron su desarrollo mucho antes de los límites de tiempo habituales.

Durante la presente semana también, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable. Se pronostican precipitaciones para el período, mejorando las reservas de humedad en las capas superiores del suelo y las condiciones para llevar a cabo la labranza estacional del suelo.

Debido a la sequía, se pospuso la labranza previa a la siembra de las áreas designadas para la siembra de colza de invierno, un cultivo que requiere una preparación precisa del suelo. Por esta razón, en muchas partes del país la siembra de colza se llevará a cabo después de los plazos agrotécnicos óptimos. Estos expiran a finales de la segunda decena de septiembre.

En la mayoría de los días del período, el clima fresco pronosticado con precipitaciones frecuentes creará condiciones para infecciones y desarrollo de patógenos en cultivos agrícolas tardíos: podredumbre parda tardía en frutales, podredumbre gris en la vid, mildiu veloso en cultivos de hortalizas.



Durante la segunda decena de septiembre, en el repollo cultivado para producción de otoño, se debe monitorear las plagas: las orugas de la mariposa blanca de la col, la polilla de la col, la polilla de la col de espalda de diamante, y cuando su densidad supere el umbral económico de daño (3–5 orugas por planta), es necesario el tratamiento con insecticidas con un intervalo corto antes de la cosecha.

El próximo período es adecuado para la siembra de espinaca y otras hortalizas de hoja para producción de otoño.

Fuente: NIMH