

Octubre – precipitaciones de importancia agronómica y buenas condiciones para el desarrollo de la colza de invierno

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



En octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas en torno y por encima de las normas climáticas y precipitaciones cercanas a los promedios mensuales. Tras la sequía estival, las lluvias económicamente significativas de septiembre, en determinadas zonas del este y en algunos lugares del oeste de Bulgaria, mejoraron la humedad de las capas superiores del suelo y las condiciones para llevar a cabo las labores estacionales de preparación del terreno.

Las precipitaciones de finales de septiembre se distribuyeron de forma desigual. En muchos lugares del centro y noreste de Bulgaria se registraron precipitaciones de hasta y por encima de los 30-35 l/m² (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrich - 53 l/m²), lo que supuso una mejora sustancial de las reservas de humedad en las capas superiores del suelo y de las condiciones para realizar las labores estacionales de preparación del terreno. A diferencia de las regiones central y oriental, en partes del oeste y sur de Bulgaria las lluvias de principios de otoño no tuvieron significación económica. En estas partes del país, el suelo seco y compactado dificulta seriamente el arado profundo y la preparación pre-siembra de las superficies destinadas a la siembra de cultivos de invierno.

Durante la mayoría de los días de la primera decena de octubre, no se pronostican precipitaciones significativas y las condiciones permitirán la preparación de los campos y su siembra con cultivos cerealistas de invierno. La sequía estival ha impedido la siembra oportuna de la colza de invierno y, en algunos lugares de las regiones de cultivo del centro de Bulgaria, las superficies se sembrarán fuera del plazo agrotécnico. Es muy probable que las siembras tardías no entren en la fase de roseta durante su vegetación otoñal, lo que garantiza la invernada exitosa del cultivo sin daños.

En octubre tienen lugar los períodos agrotécnicos óptimos para la siembra de cultivos cerealistas de invierno. El plazo para el norte de Bulgaria es durante la primera quincena del mes, para el sur de Bulgaria durante la segunda quincena, y para las regiones del Mar Negro durante la tercera decena. Las precipitaciones previstas a finales de la primera y principios de la segunda decena, así como durante la segunda mitad de la tercera decena del mes, serán de gran importancia para el progreso normal de las etapas iniciales de la vegetación del trigo y la cebada. En octubre, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán en el trigo las siguientes etapas: emergencia, primera y tercera hoja.



El tiempo cálido previsto para la segunda quincena del mes será un factor propicio para el aumento de la población del topillo común. Debe monitorearse los campos con cultivos sembrados en otoño, y cuando se alcance el umbral económico de daño – UED: 2 colonias activas/da – deben ser tratados.

Existirán condiciones para el trabajo de campo a mediados de la segunda y durante la primera mitad de la tercera decena, cuando se pronostica un tiempo relativamente seco.



En octubre, en los huertos de manzanos y perales afectados por la sarna, para reducir la infección, es recomendable al inicio de la caída de la hoja, tras la recolección del fruto, realizar un tratamiento con una solución de urea al 5%.

Para las especies de frutales de hueso, tras la caída masiva de la hoja, se recomienda una pulverización con caldo bordelés al 2% contra los agentes causantes de la cribado, la podredumbre parda temprana y el enrollamiento de la hoja del melocotonero.

A principios de octubre, se pronostican heladas en el suelo, lo que limitará las posibilidades de producción adicional de cultivos hortícolas tardíos susceptibles a daños por heladas.

Fuente: NIMH