

Noviembre – las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2024 Брой: 11/2024



En noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas.

La sequía acentuada en octubre dificultó la siembra de los cultivos de cereales de invierno y parte de las superficies planificadas se sembrarán en noviembre, después de los plazos agrotécnicos. Como resultado de las precipitaciones por debajo de lo normal en octubre, las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y

100 cm en la mayor parte del país, con excepción de algunas localidades en las regiones del noreste (Dobrich), son inusualmente bajas para mediados de otoño – en algunos lugares por debajo del 50% de la capacidad de campo (estaciones agrometeorológicas: Knezha, Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Chirpan).

Durante la primera mitad de la primera decena de noviembre, no se esperan precipitaciones y el factor limitante para el desarrollo del trigo, la cebada y la colza de invierno en la mayoría de las regiones cultivables sigue siendo el déficit de humedad del suelo.

Tras las temperaturas superiores a las estacionales a finales de octubre y principios de noviembre, se pronostica un enfriamiento y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. Durante la mayoría de los días a principios de noviembre, las temperaturas estarán por debajo de las normas climáticas, pero por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno. Durante el período, no se esperan precipitaciones de importancia económica y el factor limitante para el desarrollo de los cultivos sembrados en otoño sigue siendo el déficit de humedad del suelo. A principios de noviembre, en los cultivos de cereales de invierno sembrados a mediados de octubre, se observarán las fases de emergencia y formación de 1–2 hojas.

El riesgo de las moscas de los cereales nunca disminuye

En las etapas iniciales de la vegetación del trigo y la cebada, los cultivos deben ser monitoreados en busca de plagas. Los daños son causados por el topillo común, las larvas del escarabajo de la hoja del trigo y las moscas de los cereales, y cuando su densidad supera el umbral económico de daño, se requieren medidas oportunas de protección vegetal.



Larvas de mosca sueca

Se esperan precipitaciones y una mejora gradual de las reservas de humedad en las capas superiores del suelo durante la segunda mitad de la primera y durante la segunda decena de noviembre.



La plaga más peligrosa de los cultivos de cereales es el escarabajo de la hoja del trigo común (Zabrus tenebrioides), que ataca al trigo, la cebada, el maíz, la avena y una serie de especies de gramíneas.

Durante la tercera decena, los valores pronosticados de las temperaturas medias diarias, alrededor y por encima de lo normal para el período, superarán el mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de otoño.

A finales de noviembre, el trigo y la cebada se encontrarán en diferentes etapas de crecimiento – desde la emergencia hasta 1, 2 y 3 hojas. La etapa de la tercera hoja predominará en los cereales de invierno sembrados en octubre. En la colza, solo una parte de los cultivos logrará entrar en la etapa de formación de roseta (5–7 hojas) durante noviembre.

Durante el mes, las temperaturas mínimas pronosticadas, hasta -7°C, están por encima de los niveles críticos para los cultivos de cereales de invierno en la etapa de emergencia.

En noviembre, las condiciones para realizar las pulverizaciones de protección vegetal de otoño en los huertos serán adecuadas a principios del mes, a mediados de la segunda y durante la mayoría de los días de la tercera decena. Para las especies de frutas de pepita (manzano, peral), para limitar las infecciones de sarna, se recomienda un tratamiento con una solución de urea al 5%. Para las especies de frutas de hueso, después de la caída masiva de las hojas, es necesario pulverizar con una mezcla de Burdeos al 2% contra los agentes causantes de la criba, la podredumbre parda temprana, el enrollamiento de la hoja del melocotonero y otros patógenos.

La segunda mitad de noviembre es un período adecuado para plantar árboles frutales.