

Las precipitaciones desigualmente distribuidas en el país conducen a diferencias en el estado fenológico de los cultivos de cereales de invierno.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.11.2024 *Брой:* 11/2024



Hasta finales de la segunda y comienzos de la tercera decena de noviembre, estarán determinadas por temperaturas medias diarias superiores a las normas climáticas y por encima del mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

Durante el período, no se esperan precipitaciones significativas ni cambios en los niveles de las reservas de humedad del suelo en otoño. Las precipitaciones caídas en el período pasado se distribuyeron de forma

desigual. En muchos lugares de las regiones del noroeste, en la Llanura de Tracia Superior y en las partes más meridionales del país, se registraron precipitaciones inferiores a 10-12 l/m², completamente insuficientes para superar el déficit de humedad en los cultivos de cereales de invierno.

En algunas de las regiones orientales (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) se produjeron precipitaciones significativas, superiores a 25-30 l/m². En estas regiones, se ha producido una mejora de las reservas de humedad del suelo en las capas superiores y de las condiciones para la vegetación de los cultivos sembrados en otoño.

Mientras que en el país octubre y principios de noviembre fueron períodos de sequía y falta de precipitaciones agrícolamente efectivas, en la región de Dobrich se observan reservas de humedad del suelo suficientes, que contribuyen al buen desarrollo de las siembras de trigo. Las temperaturas permiten una emergencia normal donde la humedad es suficiente. Las temperaturas más bajas en Dobrudzha protegen las siembras de otoño de los ataques de plagas, como las moscas de los cereales y los pulgones.

Durante el período, se observarán diferentes etapas en el trigo: germinación, emergencia (estaciones agrometeorológicas: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) y formación de la 1^a-2^a y 3^a hoja (Novachene). Las diferencias en el estado fenológico de los cultivos de cereales de invierno son consecuencia de la prolongada sequía otoñal y de la siembra tardía.

Durante el período, las condiciones serán adecuadas para la plantación de árboles frutales y para la realización de actividades fitosanitarias en los cultivos frutales.

Fuente: NIMH