

A principios de diciembre, las precipitaciones previstas aumentarán las reservas de humedad en las capas superiores del suelo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas experimentarán un cambio sustancial. En el oeste de Bulgaria, se pronostica una disminución significativa de las temperaturas, pero sin valores mínimos críticos para los cultivos de otoño que están retrasados en su desarrollo. La ola de frío a principios de diciembre conducirá a una desaceleración, y en los campos más altos, donde se espera la formación de una capa de nieve, a un cese de los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno.

En la mayoría de las regiones orientales y meridionales, las temperaturas medias diarias pronosticadas estarán cerca del mínimo biológico requerido para el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno. Las condiciones para la vegetación en los cultivos de otoño se desarrollarán en las regiones a lo largo de la costa del Mar Negro, donde se pronostican temperaturas más altas.

Las precipitaciones esperadas durante el período aumentarán las reservas de humedad del suelo en las capas superiores del suelo. Esta precipitación llegará tarde para parte de los cultivos en algunos lugares de las regiones central y sur, donde, debido a un déficit de humedad del suelo, los cereales de invierno germinados no lograron emerger. Como resultado de la prolongada sequía otoñal, una gran parte de los cultivos de cereales de invierno están mal establecidos, en una etapa inicial de desarrollo, y los cultivos tienen una densidad desigual. A principios de diciembre, se observarán las siguientes etapas en el trigo: emergencia, 1-2 y 3 hojas. Una pequeña parte de los cultivos en las regiones del noreste, donde la humedad durante la primera mitad del otoño no fue un factor limitante, se encuentra en la etapa de macollaje (la región de Provadia) – la etapa apropiada para la invernada.

Durante el período, se producirán condiciones más adecuadas para plantar árboles frutales en las regiones orientales del país.

Fuente NIMH