

Diciembre – temperaturas cercanas a las normas climáticas y precipitaciones de significancia agrícola

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



A principios de diciembre, se pronostica una disminución sustancial de las temperaturas, lo que conducirá a una desaceleración y cese de la vegetación en los cultivos de otoño en la mayoría de las regiones cultivables del país.

En el este de Bulgaria, donde los valores máximos alcanzarán los 15-16°C, se crearán condiciones para una activación a corto plazo de la vegetación en los cultivos de otoño, pero no se espera un cambio significativo en el estado fenológico de los cultivos de cereales de invierno.

A principios de mes, como resultado de la prolongada sequía otoñal, una gran parte de los cultivos de trigo cesará su vegetación subdesarrollada, en una etapa inicial de crecimiento. En los cultivos de cereales de invierno predominan las fases de emergencia y formación inicial de hojas (1-2 hojas), lo que plantea dudas sobre su invernada exitosa. Una pequeña parte de los cultivos en las regiones del noreste (Targovishte, Silistra, Provadia), donde la humedad durante la primera mitad del otoño no fue un factor limitante, se encuentran en la fase de tercera hoja y al comienzo del ahijamiento (la región de Provadia) – la fase apropiada para la invernada.

Hacia el final de la primera y durante la mayoría de los días de la segunda y tercera décadas, las temperaturas pronosticadas, cercanas a las normas climáticas, mantendrán en letargo a los cultivos agrícolas en invernada. Durante el mes, se pronostican temperaturas mínimas de hasta menos 10°C que, en ausencia de cobertura de nieve y con una persistencia más prolongada, serán críticas para los cultivos de cereales de invierno subdesarrollados en las fases de emergencia y formación inicial de hojas.

Las precipitaciones esperadas en diciembre, alrededor de la norma mensual, aumentarán las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y 100 cm.

Las precipitaciones caídas a principios de diciembre superaron los 30-40l/m² en muchos lugares del centro y sur de Bulgaria (Lovech - 33l/m², Blagoevgrad - 41l/m², Sandanski - 42l/m², Plovdiv - 42l/m², Haskovo - 41l/m², Kardzhali - 50l/m², Chirpan - 39l/m²), lo que llevó a superar el déficit de humedad para los cultivos de otoño en las capas superiores del suelo. Durante el período siguiente, se esperan más precipitaciones significativas para la agricultura, así como un aumento en el nivel de las reservas de humedad del suelo en las capas de 50cm y 100cm.

Fuente: NIMH