

A principios de febrero, los cultivos de otoño se encuentran en buen estado.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025*



Las temperaturas inusualmente altas durante la última semana de enero, que alcanzaron los 17-18°C en muchas partes del país, y en ciertas regiones del norte de Bulgaria – hasta y por encima de los 20°C (Vratsa - 22°C, Pleven - 22°C, Lovech - 22°C, Veliko Tarnovo - 23°C, Silistra - 20°C), llevaron a la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de otoño en parte de las áreas de campo del país. Las temperaturas de enero por encima de lo normal también interrumpieron la latencia en algunas especies arbóreas.

Los cultivos de otoño en Dobrudzha se encuentran en buenas condiciones generales, informa el Prof. Dr. Ivan Kiryakov, Jefe del Departamento „Mejora de Cultivos de Cereales y Legumbres“ en el Instituto Agrícola de Dobrudzha – General Toshevo. El trigo, dependiendo de la fecha de siembra, se encuentra en diferentes etapas

de su desarrollo: algunos cultivos están saliendo del ahijamiento, otros están al comienzo de la fase. Su consejo es posponer la fertilización hasta la segunda quincena de febrero.

Los cultivos en el sur de Bulgaria también se están desarrollando normalmente y se encuentran en la etapa de ahijamiento. No se ha observado daño por enfermedades, plagas o muerte invernal del trigo, compartió con nosotros el Prof. Asoc. Dr. Evgeniy Dimitrov del Instituto de Recursos Genéticos Vegetales “K. Malkov” en Sadovo. Allí, la fertilización nitrogenada del trigo suele comenzar a principios de febrero.

Un factor limitante para el desarrollo de los cultivos en todo el país es la humedad en la capa del suelo, que en las condiciones de las regiones del sur del país en los últimos años se ha caracterizado por niveles muy bajos, muy por debajo de la norma.

Después del clima inusualmente cálido, hacia el final de la semana las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio, que será sustancial en la segunda mitad del período. El esperado frente frío detendrá la vegetación prematura de los cultivos de cereales de invierno y frenará el desarrollo inicial no deseado de los árboles frutales.

Durante el período, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para la invernada de los cultivos agrícolas.

Condiciones más adecuadas para llevar a cabo la labranza del suelo y la poda en viñedos y huertos ocurrirán al comienzo del período.

foto© bluedesign - Fotolia.com

Fuente: NIMH y Agri.bg