

Actividades en el huerto en febrero

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 10.02.2025 *Брой:* 2/2025



Tras el tiempo cálido para la temporada durante la última semana de enero, en el primer decenio de febrero las condiciones agrometeorológicas experimentaron un cambio. La bajada sustancial de las temperaturas a mediados del primer decenio impidió una vegetación prematura e indeseable en algunas especies arbóreas.

Durante la mayoría de los días del segundo y tercer decenio, se observarán temperaturas cercanas a las normas climáticas, con las temperaturas mínimas previstas alcanzando hasta -8 grados.

La precipitación esperada en febrero estará alrededor y por debajo de la norma y las reservas de humedad del suelo en algunos lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones meridionales (estaciones

agrometeorológicas: Novachene, Razgrad, Dolni Chiflik, Kazanlak, Lyubimets) en la capa de 100 cm permanecerán insatisfactorias para la temporada.

Durante el segundo y tercer decenio de febrero no se esperan precipitaciones significativas y las condiciones permitirán la implementación de actividades agrotécnicas estacionales: poda en huertos frutales y pulverizaciones de protección invernal de plantas en frutales.

Actividades agrotécnicas

En viveros frutales

Comienza la plantación de portainjertos en el vivero. Se inspeccionan los portainjertos injertados el año anterior. Se retiran las ataduras si esto no se hizo en otoño. Los portainjertos cuyas yemas han muerto durante el invierno se injertan con púas.

Se corta la parte silvestre del portainjerto por encima de la yema. Esto se hace antes del inicio del flujo de savia, porque de lo contrario la planta joven se debilita. Los portainjertos se cortan 2–3 cm por encima de la yema injertada con el corte inclinado en dirección opuesta al lado de la yema. Cortar el portainjerto a un muñón de 12–15 cm por encima de la yema injertada se practica en viveros expuestos a vientos fuertes.



Cuando la humedad del suelo es apropiada, se llevan a cabo las primeras labores entre hileras con un cultivador o grada de discos, y en la hilera – con un rotocultor con una sección desplazada, con el fin de preparar la superficie del suelo para el tratamiento con herbicidas de suelo.

Se recolectan púas para el reinjerto de árboles de variedades de bajo valor y para reemplazar yemas que han perecido durante el invierno en viveros frutales.

Se cuida de las semillas estratificadas. Cuando el tiempo se caliente, puede comenzar la siembra en el semillero.

En huertos frutales

Se completa el arranque de árboles enfermos, viejos y secos que ya no dan fruto. Continúa la reparación de los sistemas de espaldera viejos y la construcción de nuevos. También continúa la poda invernal para producción y rejuvenecimiento de especies de fruta de pepita.

Durante el segundo y tercer decenio de febrero, se pueden plantar árboles en nuevos huertos frutales; este es también el momento en que se aplican fertilizantes de fósforo y potasio.



Las condiciones durante el segundo y tercer decenio son adecuadas para la poda invernal de producción de especies de fruta de hueso.

Continúa el monitoreo en instalaciones vegetativas para el cultivo posterior de kiwi (*Actinidia*) y de portainjertos para cítricos y pistacho en invernaderos cálidos.

Actividades de protección vegetal

En huertos frutales

Se cortan, recogen y queman nidos de orugas, puestas de huevos y anillos, brotes y ramitas infectados por enfermedades y atacados por plagas, frutos momificados, etc., si esto no se hizo en otoño.

Los materiales de embalaje se desinfectan mediante fumigación en locales cerrados o mediante pulverización con una solución de un fungicida y un insecticida.

Si no se ha llevado a cabo en enero, durante el segundo y tercer decenio de febrero se realiza la pulverización invernal.

Se lleva a cabo con una solución al 3% de Para Zomer o Acarzin contra cochinillas y pulgones, psílicos, pulgón lanífero, huevos invernales de polillas invernales, ácaros, pupas de polillas minadoras de hojas, etc., que pasan el invierno en los troncos y en las copas de los árboles. La pulverización se realiza solo cuando la densidad de población de algunas de las plagas está por encima del umbral económico de daño.



La pulverización se lleva a cabo con una mezcla de Burdeos al 2% u otros productos a base de cobre contra la bolsa de la ciruela (pocket plum) en ciruelos, el fuego bacteriano en especies de fruta de pepita, la abolladura del melocotonero, la cribado en frutales de hueso, la podredumbre parda, el chancro bacteriano, las hojas caídas para destruir el inóculo invernante de la sarna del manzano y del peral, la mancha roja de la hoja en ciruelo, la antracnosis en nogal, la mancha foliar por cercospora y la sarna en almendro.

Si ha comenzado la emergencia de malas hierbas y el suelo está suficientemente húmedo, se aplican herbicidas de suelo en las regiones meridionales del país. Solo se trata la franja de la hilera de árboles de los huertos. Antes de aplicar los herbicidas, se afloja y nivela el suelo. Los herbicidas se pulverizan con pulverizadores que no se utilizan para pulverizar con otros pesticidas. Cuando esto no es posible, después de la pulverización, los tanques, tuberías y boquillas de los pulverizadores se lavan a fondo con agua en la que se ha disuelto un 2% de sosa cáustica o cal viva.

Se puede usar Stomp-Aqua a una dosis de 250–300 ml/da u otro herbicida con la sustancia activa pendimetalina en especies de fruta de pepita y de hueso también.

En plantaciones de bayas

Si no se ha llevado a cabo en enero, durante el segundo y tercer decenio de febrero se realiza la pulverización invernal.



Contra *didymella*, *coniothyrium*, *antracnosis*, moho gris, mancha blanca de la hoja y mancha roja de la hoja en fresa (si no se hizo después de la cosecha), y manchas foliares en frambuesa, se realiza un tratamiento con una mezcla de Burdeos al 1% u otros productos a base de cobre, pulverizando también las hojas caídas.

Contra la cochinilla roja de California en cultivos de bayas, se realiza un tratamiento con una solución al 3% de Para Zomer o Acarzin.

Se aplican herbicidas de suelo, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Se puede usar Stomp-Aqua a una dosis de 250–300 ml/da u otro herbicida con la sustancia activa pendimetalina, incorporándolo al suelo.