

A principios de marzo, las lluvias y nevadas aumentarán el nivel de las reservas de humedad del suelo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Las bajas temperaturas mínimas registradas durante el período de los últimos siete días, en algunos lugares del noroeste de Bulgaria y en los campos de los valles altos hasta y por debajo de menos 13-14°C en Vidin, Kneja, Dragoman y Kazanlak, pusieron a prueba la resistencia al frío de los cultivos de otoño subdesarrollados en condiciones sin cobertura de nieve. Valores de este orden, cuando se mantienen durante un período más largo, son críticos para los cultivos de cereales de invierno en hibernación en la etapa de 2-3 hojas.

En las regiones del noroeste, están por realizarse inspecciones de campo de los cultivos en las estaciones agrometeorológicas de Băzovec, Kneja, Kyustendil y Kazanlak para evaluar posibles daños por heladas.

Las temperaturas extremadamente bajas durante la última semana de febrero tuvieron un efecto devastador en los huertos de la región de Ruse-Silistra. En algunos lugares las temperaturas bajaron hasta menos 24 grados, como resultado de lo cual una gran proporción de las yemas frutales de los albaricoqueros se han congelado, comparte Nikolay Kolev – Presidente de la Unión de Fruticultores del Danubio – Ruse. También se observan daños por heladas en cerezo, melocotonero, ciruelo, manzano y peral.

A finales de febrero y principios de marzo, las temperaturas estarán por debajo de las normas climáticas, lo que mantendrá el estado de latencia en los cultivos sembrados en otoño. Los valores mínimos pronosticados están por encima de los umbrales críticos para los cultivos agrícolas en hibernación.

Las precipitaciones esperadas de lluvia y nieve aumentarán el nivel de las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm. Como resultado de las precipitaciones por debajo de lo normal en enero y la primera quincena de febrero, las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm en la mayor parte del país son insatisfactorias para este período del año. Se pronostica una mayor probabilidad de formación de cobertura de nieve y mejora de las condiciones de hibernación para los cultivos sembrados en otoño a finales de la próxima semana.

Fuente: NIMH