

En marzo, las temperaturas estarán alrededor y por encima de las normas climáticas, y las precipitaciones alrededor y por debajo de las normas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.03.2025 *Брой:* 3/2025



Durante la primera mitad de la primera decena, las temperaturas pronosticadas estarán dentro de rangos que restringirán el desarrollo de los cultivos agrícolas.

Durante la segunda mitad de la decena, se espera un aumento sustancial de las temperaturas y sus valores medios diarios alcanzarán y superarán el mínimo biológico requerido para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno.

Las temperaturas pronosticadas por encima de lo normal durante la segunda decena de marzo estimularán la vegetación de las siembras de otoño. Durante este período, algunas de las siembras de trigo y cebada que actualmente se encuentran en la etapa de tercera hoja entrarán en la etapa de ahijamiento.

Las temperaturas máximas esperadas, de hasta 20°C y superiores, también activarán los procesos vegetativos en gran parte de los cultivos perennes. En los frutales, las etapas de hinchazón de yemas y brotación avanzarán en las especies de hueso de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero). En los viñedos de las zonas de campo, se observará el flujo de savia.

Las condiciones durante el período serán adecuadas para la fertilización de cobertera de los cultivos de invierno con fertilizantes minerales nitrogenados, para realizar la labranza previa a la siembra y la siembra de cultivos de primavera temprana (veza, guisantes, cebada de primavera).

A principios de la segunda decena de marzo, no se esperan precipitaciones, lo que brindará la oportunidad de implementar a tiempo la pulverización preventiva prefloración en huertos con fungicidas que contienen cobre contra los agentes causantes del tizón de la flor, la enrolladura de la hoja del melocotonero, la roña y otros patógenos.

Durante la tercera decena, las temperaturas esperadas, alrededor y por encima de las normas climáticas, mantendrán activos los procesos vegetativos en los cultivos agrícolas. A finales de mes, en los cultivos de cereales de invierno que han ahijado en otoño, se observará un aumento en el coeficiente de ahijamiento.

En marzo, en los frutales, avanzarán las etapas de hinchazón de yemas y brotación. A finales de mes, en las especies de floración temprana – almendro, albaricoquero y melocotonero – se observará la etapa de yema floral, y en algunas localidades de las regiones del sur – el comienzo de la floración. En los viñedos de las zonas de campo, se observará el flujo de savia.

Durante el mes, las temperaturas mínimas pronosticadas, de hasta menos 7°C, supondrán un riesgo para los frutales en etapa de yema y etapa de floración.

Las precipitaciones de marzo aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm. A finales de febrero, en la mayor parte del país, con excepción de algunos lugares de las regiones orientales, el nivel de reservas de humedad del suelo para cultivos de cereales de invierno en la capa de un metro es bajo para la temporada – en partes de la Llanura Danubiana y las regiones del sur por debajo del 70% de la capacidad de

campo (CC). Por lo general, al final del invierno, en años sin anomalías climáticas, las reservas de humedad del suelo en la capa de un metro alcanzan niveles de hasta CC.

En marzo, las condiciones más adecuadas para realizar la labranza previa a la siembra de las áreas designadas para siembra con cultivos de primavera tempranos y de media estación ocurrirán durante la segunda mitad del mes. A mediados de marzo, comienza el período agrotécnico (15-20.03) para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, y a mediados de la tercera decena (25.03–5.04) – en la Llanura Danubiana.

Fuente: NIMH