

El estado de los cultivos de otoño para la tercera decena de marzo en la región del centro-sur de Bulgaria es bueno

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 23.03.2025 *Брой:* 3/2025



Tras el breve período frío al final de la segunda decena de marzo, con temperaturas mínimas negativas y valores críticos por debajo de los -3°C para los frutales que habían entrado en fase de floración, a finales de marzo las condiciones agrometeorológicas sufrirán un cambio. Durante la mayoría de los días del período estarán determinadas por un tiempo inestable, con temperaturas por encima de lo normal que acelerarán la vegetación de los cultivos agrícolas.



Para los cultivos frutales, sin riesgo de temperaturas mínimas críticas, procederán las siguientes fases:
hinchazón de yemas, brotación y floración en especies de hueso.



Foto© Prof. Asoc. Zlatina UR y Prof. Asoc. Evgeniy Dimitrov

Durante la tercera decena de marzo, el trigo de invierno se encontrará predominantemente en la fase de ahijamiento.

"El estado de los cultivos de invierno para la tercera decena de marzo en la región del Centro-Sur de Bulgaria es bueno", comparten la Prof. Asoc. Dra. Zlatina Ur y el Prof. Asoc. Dr. Evgeniy Dimitrov del Instituto de Recursos Genéticos Vegetales, Sadovo. Este año, a diferencia de los últimos 5-6 años, cayó nieve que, además de reponer la humedad del suelo, también protegió a las plantas del frío (temperaturas negativas). Debido al período de siembra ajustado – desde finales de octubre hasta principios de noviembre, el trigo emergió en noviembre y, como en los últimos años, no entró en dormancia invernal. Las plantas toleraron bien el período frío de la segunda quincena de febrero y no se ha observado amarilleamiento de las parcelas (quemadura de las plantas). Como resultado de las temperaturas primaverales del 5 al 17 de marzo de 2025 en la región del Centro-Sur de Bulgaria, se aceleró la vegetación del trigo común de invierno. En la actualidad, las parcelas se encuentran en la fase de ahijamiento – ahijamiento intensivo. Hasta ahora, no se han producido precipitaciones económicamente significativas en la región, pero esperamos que las cantidades de lluvia pronosticadas se materialicen y ayuden a formar plantas normales.

Tras inspecciones exhaustivas por un especialista en patología vegetal, no se han establecido ataques de enfermedades económicamente importantes. Las lluvias esperadas podrían desencadenar el desarrollo y propagación del oídio. Se ha realizado la cobertera de las parcelas con fertilizante nitrogenado con parte de la dosis de abono, así como tratamientos con fertilizantes foliares. Está próximo el tratamiento con insecticida para controlar el crisomélido de los cereales (*Lema melanopa*).

El crisomélido de los cereales representa una seria amenaza para los rendimientos del trigo

Los chubascos previstos durante el período mejorarán el contenido de humedad en la capa superior del suelo. Las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y 100 cm bajo cultivos de cereales de invierno en muchas partes del país, con excepción de algunas zonas orientales, son insatisfactorias para el comienzo de la primavera. Inusualmente bajo, por debajo del 65% de la capacidad de campo, es el nivel de reservas de humedad del suelo en algunos lugares del Noroeste de Bulgaria, estación agrometeorológica de Nikolaevo.

Los frecuentes chubascos pronosticados para el próximo período dificultarán la implementación de los tratamientos fitosanitarios en cultivos frutales contra los agentes causantes de una serie de enfermedades: moteado, tizón de la flor (podredumbre parda temprana), enrollamiento de la hoja del melocotonero.

Condiciones más adecuadas para la labranza y siembra de cultivos de primavera de media estación ocurrirán al comienzo del período. El próximo período coincide con el plazo agrotécnico para la siembra de girasol en el Sur de Bulgaria.

Fuente: NIMH