

# Abril – tiempo inestable y precipitaciones de importancia agrícola

*Автор(и):* Растителна защита  
*Дата:* 03.04.2025 *Брой:* 4/2025



En abril, las condiciones agrometeorológicas se caracterizarán por una mayor dinámica. Durante la mayor parte de los días del mes, estarán determinadas por un tiempo inestable. Las precipitaciones previstas, en torno y por encima de las normas climáticas, mantendrán buenas reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y las condiciones para la vegetación de los cereales de invierno y los cultivos de primavera sembrados. Esto se afirma en el pronóstico mensual de los agrometeorólogos del NIMH.

Durante la primera quincena de abril, la vegetación de los cultivos agrícolas procederá con temperaturas medias diarias en torno y por debajo de las normas climáticas. En el primer período decenal, el trigo en las zonas de campo entrará en la fase de alargamiento del tallo.

**Durante el segundo período decenal, se pronostican temperaturas mínimas negativas de hasta menos 2-3°C, con un mayor riesgo de daño a las flores y los frutos jóvenes de los árboles frutales.** Se esperan las últimas heladas primaverales al final del período decenal, lo que debe tenerse en cuenta al endurecer las plántulas de hortalizas.

---

## Enfermedades de Septoria en el trigo de invierno

---

Se pronostica un aumento de las temperaturas medias diarias y una aceleración de las tasas de desarrollo de los cultivos agrícolas al final del segundo y durante el tercer período decenal. Durante este período, el trigo experimentará una transición del alargamiento del tallo al espigado y la fase de espigado. El período interfásico alargamiento del tallo – espigado es crítico para la infección de cereales de invierno con la mancha foliar por Septoria.



Los cultivos de trigo también deben ser monitoreados para detectar la presencia de plagas – el crisomélido de los cereales, el chinche del trigo, y, en densidades por encima del umbral económico de daño, es necesario un tratamiento oportuno.



*Sarna del manzano*

Las precipitaciones frecuentes durante el mes crearán condiciones para un aumento del fondo de infección de una serie de enfermedades fúngicas en los cultivos frutales – tizón de las flores (podredumbre parda temprana), sarna, cribado, enrollamiento de la hoja del melocotonero, etc. Durante la primera mitad del tercer período decenal, se pronostica una mayor probabilidad de granizadas. Los árboles frutales afectados por el granizo deben tratarse con fungicidas que contengan cobre en la primera oportunidad para limitar el riesgo de infecciones secundarias por patógenos.

En abril, las condiciones más adecuadas para realizar las pulverizaciones de protección vegetal ocurrirán al principio y al final del segundo período decenal y durante la segunda mitad del tercer período decenal.

Al principio del tercer período decenal, la temperatura del suelo en la capa de 10 cm alcanzará valores adecuados para la siembra de maíz, y a finales de abril – también para los cultivos de primavera termófilos (algodón, judías, cacahuetes, sandías, melones, etc.).