

Durante la segunda decena de abril, se pronostica un aumento de las temperaturas y una mejora de las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.04.2025 Брой: 4/2025



El clima inusualmente frío durante el período pasado, con temperaturas mínimas bajo cero y nevadas, ha causado daños irreparables a los árboles frutales y a los cultivos de colza que habían entrado en la etapa de floración, según los agrometeorólogos. Los agrónomos están a punto de realizar inspecciones en las fincas para determinar los daños en las especies frutales y otros cultivos agrícolas.

La primera ola de frío a principios de mes afectó seriamente a los productores de albaricoque en la región de Silistra. A pesar de los daños causados por las condiciones invernales en el país, la variedad "Silistrenska Kompotna" ha conservado sus flores y se espera que dé frutos.

El albaricoque "Silistrenska Kompotna" es una variedad estándar principal creada en la estación experimental de la ciudad de Silistra en 1964 mediante el cruce de un albaricoque húngaro con la variedad Krasnoshchekiy. El árbol es moderadamente vigoroso con una copa globular. La floración es de media a tardía; es una variedad autopolinizante.

Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas experimentarán un cambio sustancial. A principios de la segunda decena de abril, se pronostica un aumento de las temperaturas y una mejora en las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas.

En la mayoría de los días del período, la vegetación de los cultivos de cereales de invierno procederá a un ritmo moderado, con temperaturas medias diarias cercanas a las normas climáticas para la segunda decena de abril.

Las precipitaciones generalizadas durante la primera decena, que en algunas de las zonas de campo superaron los 40 - 50 l/m², y en lugares del sur de Bulgaria alcanzaron las normas para abril (Plovdiv - 57 l/m², Haskovo – 58 l/m², Kardzhali – 57 l/m², Chirpan – 56 l/m²), mejoraron drásticamente las reservas de humedad del suelo, lo cual es de gran importancia para el curso normal de los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno y los cultivos de primavera sembrados.

Al final del período, se observará la etapa de elongación del tallo en una gran parte de los cultivos de trigo, durante la cual las plantas aumentan sus requerimientos de humedad del suelo. En los cultivos de girasol sembrados a principios de la primavera, prevalecerá la etapa de emergencia.

Las precipitaciones esperadas durante el período mantendrán un alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo, lo que retrasará la siembra de girasol más allá de los plazos agrotécnicos recomendados.

Durante la segunda decena de abril, se deben monitorear los cultivos de cereales de invierno para detectar la presencia de enfermedades y plagas: oídio, septoria, escarabajo de la hoja de los cereales, trips del trigo, chinche del trigo, etc., y si sus números superan el umbral económico de daño, se requiere un tratamiento oportuno.