

Control de malezas exprés para altos rendimientos en girasol

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Los herbicidas de FMC Agro Bulgaria – Express® 50 SG y Evorelle® Express® – proporcionan protección selectiva y campos limpios en las primeras etapas de crecimiento del girasol.

Los herbicidas Express® 50 SG y Evorelle® Express® están destinados al control selectivo de malas hierbas de hoja ancha en **híbridos de girasol tolerantes a Express® y Evorelle® Express®**. Es extremadamente importante que los herbicidas se **apliquen únicamente en híbridos tolerantes**, con la lista disponible en el sitio web de FMC. Para más información, consulte a los representantes de ventas de FMC.

Express® 50 SG y Evorelle® Express® son los únicos herbicidas registrados para su uso en una gran cantidad de híbridos de girasol tolerantes a Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

Express® 50 SG – eficacia probada contra las principales malas hierbas de hoja ancha en girasol

Express® 50 SG es un herbicida sistémico de post-emergencia que proporciona un control confiable de las malas hierbas de hoja ancha más extendidas y difíciles de controlar en girasol, como **cardo de Canadá, correhuela, bleado, estramonio, cenizo, quenopodio** y otras. El crecimiento de las malas hierbas se detiene solo unas horas después del tratamiento, y la muerte completa de las malas hierbas ocurre entre 15 y 25 días.

Para garantizar la eficacia total del producto, se debe agregar el adyuvante Trend® 90 a la solución de pulverización. No se recomienda el tratamiento de plantas estresadas.

Evorelle® Express® – una nueva solución para desafíos serios

Evorelle® Express® es un herbicida de acción combinada, destinado al control efectivo de malas hierbas de hoja ancha resistentes en girasol. Evorelle® Express® es particularmente adecuado en condiciones donde hay una propagación de malas hierbas difíciles de controlar como **apocino, cardo de Canadá, estramonio, cenizo, sorgo de Alepo** y varias **especies de quenopodio**. El producto penetra rápidamente en el tejido de la mala hierba, bloqueando los procesos enzimáticos asociados con el crecimiento. Los síntomas visibles aparecen dentro de los diez días posteriores al tratamiento, y la muerte de las especies susceptibles ocurre entre 15 y 25 días.

El control de malas hierbas crea un entorno favorable, pero el crecimiento también requiere una nutrición equilibrada. Los fertilizantes foliares y bioestimulantes de FMC – **Rhizomagic, Seamac™ OR, Nuvola™ AMIN y BO-LA™** – suministran a las plantas los nutrientes necesarios, aminoácidos y compuestos bioactivos que apoyan el crecimiento, aumentan la tolerancia y compensan las condiciones de estrés. Algunos de ellos, incluidos Rhizomagic, Seamac™ OR y Nuvola™ AMIN, están incluidos en la lista de la Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria (BFSA) de fertilizantes orgánicos y organominerales registrados y son **adecuados para su uso en ecoesquemas**.