

En mayo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable con temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas del mes.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025*



Tras el tiempo más fresco de lo habitual a principios de mayo, se pronostica para mediados de la primera decena una mejora de las condiciones térmicas y una aceleración de los procesos vegetativos en los cultivos agrícolas. Durante la decena, se prevén precipitaciones de significación agronómica y una mejora de las reservas de humedad del suelo – de importancia clave para el curso normal de las fases reproductivas en el desarrollo de los cultivos de

cereales de invierno. En trigo y cebada, se observarán las etapas de encañado, transición al espigado y espigado, principalmente en cultivos de algunas localidades de las regiones orientales y meridionales del país. En maíz y girasol, tendrán lugar la emergencia y la formación inicial de hojas. Durante el periodo, se debe monitorear los cultivos de cereales de invierno en busca de plagas: chinche del trigo, crisomela de los cereales, pulgón de la avena, y cuando su densidad de población supere el umbral económico de daño, se debe realizar un tratamiento a la primera oportunidad.

En viñedos, se debe vigilar la aparición de orugas de la primera generación de la polilla del racimo de la vid y los daños causados por ácaros (araña amarilla de la vid).

Las precipitaciones frecuentes durante el periodo crearán condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades fúngicas. Se espera un aumento de las infecciones primarias de mildiu en viñedos, lo que requiere pulverizaciones preventivas oportunas tras la estabilización del tiempo.

Durante los primeros días de mayo, las temperaturas del suelo a una profundidad de 10 cm en las zonas de campo del país estarán en niveles adecuados para la siembra de cultivos de primavera amantes del calor: algodón, cacahuetes, judías, sandías, melones, etc.



Durante la segunda y la primera mitad de la tercera decena, el desarrollo de los cultivos agrícolas proseguirá a un ritmo moderado. Las precipitaciones previas mantendrán buenas reservas de humedad del suelo y las condiciones para que se produzca la formación y el llenado del grano en trigo y cebada. Durante este periodo, los cultivos de cereales de invierno tienen altos requerimientos de humedad del suelo.

Las temperaturas pronosticadas por encima de lo normal en la segunda mitad de la tercera decena acelerarán el desarrollo de los cultivos agrícolas. A finales de mayo, en algunas localidades de las regiones orientales y meridionales, se observará el inicio de la etapa de madurez lechosa en trigo y cebada.

En maíz y girasol, tendrá lugar la formación de hojas. Los cultivos de girasol sembrados dentro del periodo agrotécnico recomendado alcanzarán la etapa de botón floral a finales de mayo.



En mayo, en los cultivos frutales no afectados por heladas primaverales, tendrá lugar la formación y el agrandamiento de los frutos cuajados. En viñedos, se observará la separación de las inflorescencias, y a finales del mes – la etapa de floración. Estas etapas son críticas para la infección con mildiu y oídio.

Enfermedades de la roya en el trigo común de invierno

Las precipitaciones frecuentes en mayo crearán condiciones para un aumento del fondo de infección de una serie de enfermedades fúngicas: en trigo – royas (parda, amarilla) y fusariosis de la espiga; mildius en cultivos hortícolas y viñedos.



Roya parda de la hoja en trigo

A finales de la primera y principios de la segunda decena, no se puede descartar la posibilidad de formación de heladas, lo que debe tenerse en cuenta al transplantar plántulas de hortalizas.

Durante la segunda decena de mayo, se pronostica una mayor probabilidad de tormentas de granizo. En caso de daños por granizo, es aconsejable que los cultivos afectados sean tratados a la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para promover una curación más rápida de las heridas y reducir el riesgo de infecciones secundarias por patógenos.

Protección vegetal en viñedos en mayo

En mayo, debe continuar el monitoreo de los cultivos de cereales de invierno en busca de plagas: chinche del trigo, crisomela de los cereales, y cuando su densidad de población supere el umbral económico de daño, se debe realizar un tratamiento a la primera oportunidad.



En viñedos, es necesario monitorear la aparición de orugas de la primera generación de la polilla del racimo de la vid y los daños causados por ácaros (araña amarilla de la vid).