


Actividades agrotécnicas en el huerto en mayo

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.05.2025 *Брой:* 5/2025



En mayo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable, con temperaturas y precipitaciones cercanas a las normas climáticas del mes. Durante el mes, en los frutales no afectados por las heladas primaverales, tendrá lugar la formación y el engrosamiento del cuajado.

La temperatura media en mayo estará alrededor y por encima de la norma, que se sitúa entre 24 y 25 °C en la mayoría de las zonas, 20-23 °C en la costa del Mar Negro y entre 5 y 15 °C en las montañas.

El total mensual de precipitaciones será promedio para el país y estará alrededor y por debajo de la norma, que para las llanuras es entre 50 y 70 l/m², y en las zonas montañosas - entre 80 y 100 l/m².

Sobre el oeste de Bulgaria y la Bulgaria central, se esperan cantidades cercanas a la norma climática de 60-90 l/m². La probabilidad de precipitación es considerablemente menor en el este de Bulgaria, donde el tiempo será más a menudo soleado y algo más seco. Las precipitaciones esperadas allí estarán por debajo de las normas climáticas – hasta 35-40 l/m².

Hacia el final de la primera decena, los valores diurnos alcanzarán 28-33 °C, y en algunos lugares hasta 35 °C, lo que acelerará los procesos vegetativos en los frutales. Habrá muchas horas de sol y precipitaciones por la tarde, principalmente sobre las montañas.

Durante la primera decena del mes, caerán cantidades significativas de precipitación principalmente en el oeste y centro de Bulgaria. La probabilidad de granizo también es alta. Las temperaturas diurnas estarán entre 23-25°C, y sobre el este de Bulgaria ligeramente más bajas – hasta 20-22°C.

La segunda decena comenzará con más horas de sol. Las temperaturas se mantendrán cercanas a los valores habituales. La probabilidad de precipitación será menor en el este de Bulgaria. Las temperaturas diurnas estarán cercanas a lo normal para mayo y oscilarán entre 25-29°C, y sobre el este de Bulgaria – 24-25°C.

Hacia el final de la segunda decena de mayo, se espera un ligero descenso y temperaturas más bajas. La atmósfera volverá a ser inestable. Se formarán condiciones para precipitaciones, granizo y tormentas, y por encima de los 2000-2200 m s.n.m. también para nieve.

En caso de daños por granizo, es aconsejable que los cultivos afectados sean tratados a la primera oportunidad con fungicidas que contengan cobre para asegurar una curación más rápida de las heridas y reducir el riesgo de infecciones secundarias por patógenos.

Durante los primeros días de la tercera decena, el tiempo será inestable y se mantendrá frío para el período. En muchos lugares por la tarde habrá chubascos de corta duración con tormentas. Hacia el final del período, las precipitaciones disminuirán y las temperaturas subirán, lo que conducirá a un desarrollo acelerado de los frutales. También se espera un período de sequía, con precipitaciones ocurriendo en menos lugares. Los valores diurnos oscilarán entre 25-27 °C hasta el 23-24 de mayo y 35-37 °C hacia el final del mes.

En viveros frutales

En los viveros, se monitoriza el desarrollo adecuado de las yemas injertadas. Si es necesario, se realiza un nuevo desyemado de los brotes que emergen del portainjerto. Cuando existe riesgo de corte, se aflojan las

ataduras de los portainjertos reinjertados en primavera. Se cultivan los semilleros, las plantaciones madre y los viveros. Si es necesario, se aclaran las plantas en los semilleros.

En huertos frutales



Al final de la floración, las colmenas se trasladan a otro lugar – a una distancia no menor de 5 km.

En los huertos de melocotoneros recién plantados con copas en forma de vaso o vaso mejorado, se realiza la poda de formación.



Se procura garantizar un establecimiento y desarrollo adecuado de los árboles en los huertos recién plantados – escarda, desyemado, riego cuando sea necesario. Los árboles en plantaciones jóvenes densas se atan al sistema de espaldera. Las ramas vigorosas de dos y tres años se doblan y atan a los alambres para reducir su vigor vegetativo. En plantaciones jóvenes – de 2 y 3 años – se elimina parte del cuajado en el eje principal – la rama central. Continúa el aclareo de frutos en melocotoneros.

Tras la finalización definitiva de la caída de frutos, se riegan los huertos. Se incorpora al suelo la masa orgánica de los cultivos de abono verde.

El suelo se mantiene libre de malas hierbas y se afloja mediante cultivaciones superficiales regulares con cultivador o grada.

A finales de mes, los árboles en producción se abonan de cobertera con 15-20 kg/da de nitrato amónico o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado, seguido de una labor superficial del suelo. En caso de sequía, se realiza riego.



Continúa la recolección de cultivares tempranos de cerezo.

En plantaciones de fresa

Continúa la plantación primavera-estival de estolones de fresa refrigerados. Tras la plantación, se aplica riego por aspersión. Se escardan las áreas plantadas en abril. En regiones más altas, se extiende paja bajo los pedúnculos florales hacia finales de mes.



Continúa la recolección. Cuando los frutos se transportan a distancias más largas, pueden recolectarse ligeramente antes.

En caso de sequía durante la maduración de los frutos, es necesario el riego por aspersión o superficial (por gravedad).

En plantaciones de frambuesa

Se realiza el cultivo regular del suelo. Los tallos de algunos cultivares se atan a la estructura de soporte, y para los cultivares restantes se procura que no se doblen hacia los entrehileros. Durante la floración es aconsejable proporcionar dos colonias de abejas por cada 10 da.

En plantaciones de grosella negra



Continúa el cuidado de los bancales de enraizamiento – cultivo y riego. Se eliminan los brotes basales débiles y sobrantes. En caso de sequía, se realiza un riego abundante. Se comienza el trabajo de organización de la cosecha de frutos de grosella negra.

En plantaciones con otros cultivos

Los portainjertos de limón se injertan con una yema en crecimiento. Continúa el injerto del caqui.

La superficie del suelo se mantiene libre de malas hierbas y se afloja regularmente mediante labores superficiales. Hasta la segunda decena, se proporcionan riegos frecuentes y regulares.



Continúa la plantación de *Actinidia chinensis* al aire libre. Tras la plantación, se realiza riego. Las vides de kiwi se atan regularmente a las ramas auxiliares de soporte. El tallo no debe enrollarse alrededor de la rama de soporte y se eliminan los brotes laterales en él. Se proporcionan tres colonias de abejas por cada 10 da de kiwi.