

Durante la última semana de mayo, el desarrollo de los cultivos agrícolas transcurrirá con temperaturas por debajo de las normas climáticas y precipitaciones útiles.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025



Durante el próximo período de siete días, las condiciones agrometeorológicas seguirán determinadas por un tiempo inestable. Durante el período, se pronostican precipitaciones de significación agronómica, así como una mejora de las reservas de humedad del suelo incluso en las capas más profundas.

Las precipitaciones durante la primera y segunda decena de mayo se distribuyeron de manera desigual. En muchos lugares del sur de Bulgaria, las precipitaciones de mayo alcanzaron y superaron las normas mensuales

(Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). En parte de las regiones del sur, las reservas de humedad del suelo en las capas de 50 y 100 cm alcanzaron niveles de hasta y por encima del 85% de la capacidad de campo (CC), óptimos para el desarrollo de los cultivos de cereales de invierno y los cultivos de primavera sembrados.

En contraste con las regiones del sur, en lugares del noreste de Bulgaria (estación agrometeorológica de Silistra), como resultado de precipitaciones por debajo de lo normal en abril y en la primera mitad de mayo, el nivel de las reservas de humedad del suelo para los cultivos de cereales de invierno al final de la segunda decena es bajo – por debajo del 65% de la CC.

Durante la última semana de mayo se espera una mejora sustancial de las reservas de humedad del suelo en las regiones del noreste, lo cual es de gran importancia para los cultivos de cereales de invierno, que tienen altos requerimientos de humedad del suelo.

Durante el período, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá con temperaturas por debajo de las normas climáticas. Hacia finales de mayo, tendrá lugar la formación y el llenado del grano en los cultivos de cereales de invierno.



Durante este período interfásico, los daños al trigo son causados por las larvas del chinche del trigo, lo que hace necesario el examen de campo de las parcelas, y cuando la densidad de la plaga excede el umbral

económico de daño (2 larvas/m²), se debe realizar un tratamiento a la primera oportunidad.

En el girasol y el maíz, tendrá lugar la formación de hojas.

A finales de mayo, predominará la floración de las inflorescencias en la vid, una etapa crítica para la infección con mildiu velloso y oídio.

Durante la última semana de mayo, el mayor contenido de humedad en las capas superficiales del suelo restringirá la implementación de las operaciones de labranza estacionales. Se esperan granizadas durante el período. Para los frutales, cultivos hortícolas y viñedos afectados por el granizo, es aconsejable realizar tratamientos con fungicidas que contengan cobre para reducir el riesgo de infecciones secundarias por patógenos.

Fuente: NIMH