

Actividades agrotécnicas en el huerto en junio

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.06.2025 *Брой:* 6/2025



Durante la mayor parte de los días de junio, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas y precipitaciones en torno y por debajo de la norma mensual. La temperatura media mensual para la mayor parte del país estará entre 25 y 26 °C, con temperaturas tradicionalmente ligeramente más altas en el valle del río Struma - alrededor de 27 °C, y en las zonas de Ruse y Vidin – 26-27 °C. Las temperaturas más bajas durante el mes estarán entre 12 °C y 15 °C, y las más altas - entre 32 °C y 35 °C, con valores de hasta 37 °C posibles en regiones individuales.

En cuanto a las precipitaciones, este año se espera que el mes sea similar a mayo. Las cantidades normales de precipitación en las tierras bajas oscilan entre 40 y 90 l/m², en los Pre-Balcans y montañas - entre 95 y 100

I. Hacia finales de mes, a menudo se observa sequía, pero este año el período seco será en la primera decena del mes.

A principios de junio, se pronostica un aumento significativo de las temperaturas y una aceleración en las tasas de desarrollo de los cultivos agrícolas. Las precipitaciones esperadas en la segunda mitad de la primera decena mantendrán un buen nivel de reservas de humedad en las capas de suelo de 50 cm y 100 cm. Las importantes lluvias de finales de mayo mejoraron las reservas de humedad del suelo, y en la mayoría de las zonas de cultivo, alcanzaron niveles de hasta y superiores al 85% de FC.

Prevalecerá el tiempo soleado en el país, pero hasta el mediodía; las tardes verán precipitaciones y tormentas eléctricas, localmente, principalmente sobre las montañas. En muchos lugares de Bulgaria Occidental y regiones montañosas, son posibles lluvias de corta duración acompañadas de actividad tormentosa en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es menor en las regiones orientales y en las llanuras. Las temperaturas en el país estarán entre 28-32 °C. Se transportará una masa de aire relativamente más cálida, y a mediados de la primera decena, las temperaturas superarán los 32 °C. Esperamos un aumento significativo de las temperaturas alrededor del 5-9 de junio. En ese momento, la atmósfera será inestable, y se esperan precipitaciones, aunque localizadas. Las temperaturas esperadas estarán entre 32-35 °C. Las altas temperaturas también son un requisito previo para fenómenos extremos, especialmente sobre Bulgaria Occidental y Noroccidental, y es probable que estos fenómenos vayan acompañados de granizo grande. Un nuevo descenso de las temperaturas, aunque leve, ocurrirá hacia finales de la primera decena.

También se pronostican condiciones térmicas superiores a lo normal para la segunda decena de junio. La segunda decena comenzará con más horas de sol. El tiempo en general será predominantemente soleado y caluroso. Las condiciones para precipitaciones más significativas existirán alrededor del 13 y 17 de junio. Los días comenzarán con más horas de sol. En las horas de la tarde, principalmente en las montañas, se desarrollarán nubes de cúmulos, y lloverá y tronará en más lugares. La probabilidad de precipitación es menor en la Llanura Danubiana y Bulgaria Oriental. Las temperaturas diurnas estarán entre 32-36 °C, y sobre Bulgaria Oriental ligeramente más bajas – hasta 25-30 °C. Hacia mediados de la segunda decena de junio, la atmósfera se desestabilizará y se producirán precipitaciones en más lugares.

Durante la tercera decena de junio, el desarrollo de los cultivos agrícolas se producirá a temperaturas cercanas a las normas climáticas. En los primeros días de la tercera decena, el tiempo será inestable pero se mantendrá cálido para el período. En muchos lugares, se desarrollarán nubes cumulonimbos, y caerán lluvias de corta duración con tormentas eléctricas por la tarde. En los últimos días del mes, se espera una estabilización de la

masa de aire y un aumento de las temperaturas. Hacia finales del período, las precipitaciones disminuirán y las temperaturas subirán. También se espera un período de sequía, con precipitaciones observadas en menos lugares. Los valores diurnos estarán entre 32-37 °C.

En viveros de frutales

Los semilleros se fertilizan con 6-8 kg de nitrato de amonio o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado por decárea y se cultivan. Si es necesario, se realiza la irrigación.

Las plantaciones madre se fertilizan con 10-15 kg de nitrato de amonio o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado por decárea y se aporcan. Si es necesario, se riegan antes del aporque.

Se realiza el deshijado en los viveros para facilitar el crecimiento normal de los injertos. Los portainjertos y los viveros se preparan para el injerto de yemas.

En huertos frutales

Se tiene cuidado de que los atados de las ramas de los árboles frutales reinjertados y las formas silvestres no se claven; si es necesario, se aflojan con prontitud. Los brotes competidores que hayan crecido de la planta madre deben eliminarse a tiempo. Los árboles recién plantados se cultivan regularmente. Si es necesario, se riegan.

Después de la segunda decena, las plantaciones frutales jóvenes se fertilizan con 15-20 kg de nitrato de amonio por decárea o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado, y se realiza un cultivo superficial del suelo.

Al formar una palmeta, las ramas esqueléticas se doblan cuando alcanzan una longitud total de 2 – 2,5 m para el primer nivel, 1,5-2 m para el segundo y 1 m para el tercero. Para los árboles de crecimiento débil, se colocan en un ángulo de 45-50°, y para los de crecimiento fuerte – a 45-45° con respecto a la horizontal. Cuando hay ramas esqueléticas de diferentes longitudes en un nivel, solo se dobla la fuerte, mientras que la débil se deja crecer y se dobla más tarde.

Continúa el aclareo mecánico de frutos de melocotón.

En zonas con riego asegurado, se realiza la siembra de cultivos de abono verde.



Comienza la cosecha masiva de cerezas y guindas

En plantaciones de fresas

Se plantan los últimos plantones de fresa almacenados en un refrigerador. Continúa el cuidado de la deshierba de cultivos jóvenes y recién plantados. Si es necesario, se realiza la irrigación.

La recolección continúa. No recolecte durante las horas calurosas del día o cuando se haya formado rocío. Para el consumo en fresco, se recogen junto con el cáliz del fruto.

En las zonas de cultivo más cálidas, después de la recolección de los últimos frutos, la paja se recoge y se retira inmediatamente. Las plantaciones se fertilizan con 8-10 kg de nitrato de amonio o la misma cantidad de otro fertilizante nitrogenado por decárea, y se realiza el primer cultivo post-cosecha. Si es necesario el riego, se hace antes de la fertilización.

En plantaciones de frambuesas

Se realiza un cultivo regular del suelo y se irriga si es necesario. En las plantaciones en producción, continúa la limpieza de las hileras de los chupones muy débiles y excesivos. La estructura de alambre se mantiene fuerte.



En algunas regiones, la cosecha de variedades tempranas de frutas comienza a mediados de junio.

Cuando comienza la maduración, las colonias de abejas se trasladan a otras plantaciones, pero a una distancia no inferior a 5 km.

En plantaciones de grosella negra

El suelo en los lechos de enraizamiento se cultiva 2-3 veces según el riego, las lluvias y la presencia de malas hierbas. Se realiza un cultivo regular tanto para plantaciones jóvenes como en producción. Hacia mediados de mes, comienza la cosecha de frutos en algunas zonas de cultivo más cálidas.

En plantaciones con otros cultivos

Continúa el injerto de portainjertos de limón sobre yemas activas.

Continúa el cuidado de los esquejes enraizados de granado, higuera y espino amarillo en campo abierto, cultivando y regando regularmente el vivero. Se realizan los tratamientos necesarios contra las malas hierbas.

Hacia finales de mes, los portainjertos no injertados del año pasado se injertan con yemas activas de caqui.



Continúa el atado de las vides de kiwi a estacas auxiliares. La fertilización se realiza con el último 1/3 de la norma anual de nitrógeno especificada para el kiwi. Los brotes laterales en el tallo principal del kiwi se eliminan para estimular su desarrollo y su formación general. Se le da forma de letra T.