

Durante la última década de junio, la vegetación de los cultivos de primavera procederá bajo altas temperaturas y déficit de humedad del suelo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.06.2025 *Брой:* 6/2025



Tras las altas temperaturas de mediados de junio, que alcanzaron y superaron los 35-36° en algunas regiones del sur, no se han observado cambios en las condiciones agrometeorológicas. Las lluvias esperadas a principios del periodo carecerán de significación económica. Debido a las lluvias subnormales y a las temperaturas por encima de lo normal durante el primer y segundo decenio de junio, las reservas de humedad del suelo para los cultivos de primavera disminuyeron significativamente. En algunas regiones del sur, el nivel de reservas de humedad en la capa de 50 cm para el maíz y el girasol es inusualmente bajo para el comienzo del verano, por debajo del 60% de la capacidad de campo.

Durante la mayoría de los días del próximo periodo, la vegetación de los cultivos de primavera se desarrollará a temperaturas alrededor y por encima de las normas climáticas para el tercer decenio de junio, y en muchas regiones de campo, también con un déficit de humedad del suelo. Este es el tercer año consecutivo con una sequía pronunciada durante los meses de verano, lo que es perjudicial para los cultivos de maíz y girasol.

Durante el periodo, se producirá la formación de inflorescencias en los girasoles.



El ataque del gorgojo gris del maíz es particularmente peligroso para los cultivos de primavera. Científicos del Instituto Agrícola – Shumen realizaron un estudio de los campos de maíz y girasol en las regiones de Veliko Tarnovo, Targovishte, Ruse, Razgrad y Shumen y encontraron daños significativos por la plaga.

Se producirá la formación de hojas en el maíz. A finales de junio, se observará el inicio de la fase de espigado en los híbridos tempranos de maíz.

Plagas del Maíz

Durante el tercer decenio de junio, debe continuar la inspección de los cultivos de maíz para detectar la presencia de una de las plagas más peligrosas – el taladro europeo del maíz – y si los números superan el

umbral económico (10 masas de huevos por cada 100 plantas), es necesario un tratamiento insecticida contra las larvas antes de que se introduzcan en los tallos.

El Taladro Europeo del Maíz (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – una Plaga Económica Importante del Maíz

Durante el periodo, se observará la madurez cerosa y completa en el trigo en las regiones de campo. Para los cultivos en campos de gran altitud, se producirá la madurez lechosa y una transición a la madurez cerosa.

Se pronostican altas temperaturas máximas y riesgo de incendios durante la cosecha de grano.