


El factor limitante para el desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos en agosto sigue siendo el déficit de humedad del suelo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 Брой: 8/2025



En agosto, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas y precipitaciones en torno y por debajo de la norma mensual. El déficit de humedad del suelo seguirá siendo un factor limitante para el desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos también en agosto.

Las precipitaciones caídas a finales de julio, tras el agravamiento de la sequía, fueron locales e insuficientes para superar el déficit hídrico en los cultivos agrícolas tardíos. En la mayoría de las regiones de campo, la humedad productiva está ausente en las capas de suelo de 50 y 100 cm.

Durante la mayoría de los días de agosto, el tiempo relativamente seco previsto hará necesario aplicar dosis de riego aumentadas para los segundos cultivos y los híbridos de maíz tardío. También se requerirán dosis de riego aumentadas para los frutales, que se encuentran en proceso de formación de las yemas florales para el próximo año.

La nueva generación de híbridos de girasol del DAI es un formato de alta intensidad para la gestión del rendimiento

En agosto, antes de lo habitual para el país, se completará el desarrollo de los cultivos de primavera tardíos. A principios de agosto, en los cultivos de girasol del sur de Bulgaria, se observará madurez técnica (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol), y a finales de la primera y principios de la segunda decena - también en los cultivos de una gran parte de las regiones de campo. Los híbridos de maíz más tempranos cultivados en condiciones de riego entrarán en madurez cerosa y completa durante la primera decena. Los híbridos de ciclo medio-tardío completarán su desarrollo en la tercera decena de agosto.

Debido a las condiciones agrometeorológicas desfavorables de la primera mitad del verano, con sequía prolongada y temperaturas extremadamente altas, se esperan rendimientos bajos de maíz y girasol.

Las persistentes altas temperaturas de julio, que continuarán en agosto, amenazan seriamente la cosecha de los cultivos de primavera.

El único centro de mejora genética de girasol del país es el Instituto Agrícola de Dobrudzha, donde los esfuerzos de selección se centran en crear nuevas variedades de girasol resistentes a la jorra, el mildiu vellosa y la sequía. Uno de los nuevos híbridos del Instituto – “Dara”, apto para el cultivo con la tecnología “Express” y resistente al mildiu vellosa hasta la raza 731 y a la jorra hasta la raza G, tiene un muy buen comportamiento en condiciones de sequía y altas temperaturas.

Para agosto, se pronostican temperaturas máximas en el rango de 35–40°C. Estos valores tendrán un impacto negativo en la floración y fecundación de los cultivos hortícolas de producción tardía (pepinos, judías verdes, calabacines).

Las condiciones meteorológicas durante el mes limitarán el desarrollo de enfermedades fúngicas, con la excepción de los oídios en cultivos hortícolas, frutales y vides. Se espera un aumento de las poblaciones de ácaros. En los viñedos, es necesario monitorizar la densidad de orugas de la tercera generación de la polilla del

racimo de la vid. Donde sea necesario, la aplicación de tratamientos fitosanitarios en agosto debe realizarse durante las horas más frescas del día (a temperaturas inferiores a 25°C), utilizando productos con un plazo de seguridad apropiado, de acuerdo con el periodo de maduración de los cultivos.

Fuente: NIMH