

En septiembre, no se esperan precipitaciones de importancia agrícola, y las condiciones permitirán la formación de rendimiento adicional de los cultivos hortícolas tardíos.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 *Брой:* 9/2025



En septiembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores a las normas climáticas y precipitaciones alrededor y por debajo de la norma mensual.

Tras el agravamiento de la sequía, las lluvias de finales de agosto fueron locales y solo en determinados lugares de las regiones central y oriental

humedecieron la capa superior del suelo. En la mayoría de las regiones cultivables, la humedad productiva está ausente en las capas de suelo de 50 y 100 cm.

Durante la primera y la segunda decena de septiembre, no se pronostican precipitaciones de importancia agronómica, y en muchos lugares de las regiones cultivables el suelo seco y compactado dificultará la realización de la labranza profunda y la preparación pre-siembra de las áreas designadas para la siembra de colza. Es alta la probabilidad de retrasos importantes en la siembra de este cultivo oleaginoso, que requiere técnicas agronómicas precisas. El período agrotécnico para la siembra de colza es desde finales de agosto hasta el final de la segunda decena de septiembre.



En septiembre, las condiciones térmicas pronosticadas por encima de lo normal acelerarán las etapas finales de desarrollo de los cultivos agrícolas tardíos que han superado los efectos adversos de la prolongada sequía estival. A principios de mes, los híbridos de maíz de ciclo medio-tardío cultivados en condiciones de riego se encontrarán en estado ceroso y de

madurez plena, mientras que los híbridos tardíos estarán en transición de la madurez lechosa a la cerosa.

En la mayoría de los días del mes, el tiempo relativamente seco y cálido pronosticado para finales del verano y principios del otoño proporcionará condiciones adecuadas para la cosecha de la uva. Como resultado de las temperaturas estivales superiores a lo normal, las variedades tardías de uva para vino alcanzarán la madurez tecnológica antes de las fechas habituales.

Las condiciones meteorológicas de septiembre limitarán el desarrollo de enfermedades fúngicas, con la excepción de los oídios. Para los cultivos hortícolas de producción tardía al aire libre, no se debe subestimar la pulverización de protección de plantas contra ácaros, polilla de la col y gusano del algodón, que causan daños y deterioran la calidad del rendimiento hortícola.

Durante el mes, finaliza la actividad nociva de gran parte de las plagas en los cultivos frutales. A finales de septiembre, es recomendable inspeccionar los huertos de perales para detectar la presencia del gorgojo del brote del peral. El control de esta plaga solo es efectivo contra los adultos a principios del otoño. Cuando la densidad de la plaga supera el umbral económico de daño (3 escarabajos por árbol), se debe realizar un tratamiento.

Como resultado de las temperaturas estivales superiores a lo normal, algunas de las variedades tempranas de árboles frutales de otoño no afectadas por las heladas primaverales alcanzarán la madurez de cosecha (manzanas: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, etc.).

En septiembre, no se pronostican temperaturas mínimas críticas, y las condiciones permitirán la formación de producción adicional a partir de cultivos hortícolas tardíos susceptibles a las heladas.