

# Octubre – Anomalías Climáticas y un Inicio Más Tardío de la Siembra Otoñal de Cultivos de Cereales de Invierno

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2025 Брой: 10/2025



Durante los primeros diez días de octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima inestable y temperaturas medias diarias alrededor y por debajo de las normas climáticas. Durante este período de diez días, no se pronostican temperaturas mínimas críticas para los cultivos de hortalizas de producción tardía en las áreas de campo, lo cual es un requisito previo para cosechar productos adicionales de cultivos sensibles a las heladas (tomates, pimientos, calabacines, pepinillos, etc.).

Durante este período, se pronostican lluvias económicamente significativas, mejorando la condición de las capas superiores del suelo y las condiciones para realizar el cultivo estacional del suelo. La sequía de finales de verano y principios de otoño en muchas partes del país dificultó el cultivo de presiembra de las áreas destinadas a los cultivos de otoño.

Las fuertes lluvias durante los primeros diez días de octubre, que en muchos lugares del país superaron el doble, y en el norte de Bulgaria, el triple de las normas climáticas: Lovech - 152 l/m<sup>2</sup> (296%), Pleven - 167l/m<sup>2</sup> (342%), V. Tarnovo - 187l/m<sup>2</sup> (351%), Razgrad - 171 l/m<sup>2</sup> (302%), Ruse - 254 l/m<sup>2</sup> (450%), sobresaturaron las capas superiores del suelo y aumentaron las reservas de humedad en las capas de 50 y 100 cm.

## Inicio de la siembra de otoño



Condiciones agrometeorológicas desfavorables – la sequía y las posteriores lluvias excesivas durante los primeros diez días de octubre obstaculizaron el cultivo estacional del suelo, y en algunas regiones del país, como el oeste de Bulgaria, la siembra de cultivos de cereales de invierno se está retrasando, aunque ya se ha dado el inicio oficial de la siembra de otoño.

Los primeros diez días de octubre es el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, del 15 al 25 de octubre, en el sur de Bulgaria, y a finales de mes, en las regiones costeras del Mar Negro. Según datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación, la siembra de trigo está atrasada en más del 52%, con

menos áreas sembradas en el país en comparación con el mismo período del año pasado. También se observa un retraso en la cebada y el centeno, pero en menor medida.

---

## Posibilidades de uso y aplicación del triticale

---

Según datos del Ministerio de Agricultura y Alimentación, se observa un aumento significativo en las áreas de triticale en la campaña de siembra de otoño de este año, casi un 54% más en comparación con el año anterior. En 2024, las áreas con este cultivo eran de 102 xa en este punto del año, mientras que actualmente, los campos sembrados con triticale son de 167 xa.

El interés por este cultivo, que es un híbrido intergenérico de trigo y centeno, ha crecido en los últimos años debido a su combinación del alto potencial de rendimiento del trigo y la resistencia a enfermedades del centeno.



Se ha observado una tendencia conocida de aumento de las áreas de colza en las últimas temporadas. Este año, el crecimiento del cultivo durante la siembra de otoño es del 39% en comparación con los datos de la campaña del año pasado. A día de hoy, los campos sembrados con colza superan las 73.3 mil hectáreas.

Durante la mayoría de los días de la segunda y tercera decena, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima relativamente seco y temperaturas cercanas a lo normal. Hay una alta probabilidad

de que las fases iniciales de vegetación de los cultivos de cereales de invierno sembrados a finales de octubre transcurran con déficit de humedad. A finales de mes, para el trigo y la cebada, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las fases de emergencia y formación de 1-2 hojas.

Durante este período, las condiciones serán adecuadas para completar la vendimia, para la recolección de variedades de árboles frutales de otoño, y a finales de octubre, también para la realización de actividades fitosanitarias. Para los huertos de manzanos y perales afectados por la sarna, para reducir la infección, es aconsejable tratar con una solución de urea al 5% al inicio de la caída de las hojas, después de cosechar los frutos.

Para las especies de frutas de hueso, después de la caída masiva de hojas, se recomienda rociar con una mezcla bordelesa al 2% contra los agentes causantes de la enfermedad del cribado, la podredumbre parda temprana, el enrollamiento de las hojas del melocotonero, etc.