

En la segunda quincena de noviembre habrá condiciones para la realización de actividades agrotécnicas de temporada y la plantación de árboles frutales

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Las condiciones agrometeorológicas en noviembre estarán determinadas por temperaturas cercanas y superiores a las normas climáticas y precipitaciones en torno y por debajo de la norma para el mes.

Para finales de la primera y principios de la segunda decena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable. Las precipitaciones de finales del periodo de siete días anterior y

las esperadas durante el siguiente retrasarán aún más, más allá de los plazos agrotécnicos, la siembra del trigo. Hasta el momento, se ha sembrado aproximadamente la mitad de las áreas previstas.

Las precipitaciones de octubre, que superaron las normas climáticas dos o tres veces (Sofía, Pleven, Lovech, V. Tarnovo, Razgrad, Ruse, Pazardzhik, Stara Zagora, Burgas), mantuvieron un alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo, lo que retrasó el cultivo previo a la siembra y la siembra de cereales de invierno. Debido a esta razón objetiva, en la mayor parte del país, con la excepción de algunas áreas en la llanura del Danubio y en las regiones orientales, se incumplieron los plazos agrotécnicos para la siembra de trigo en octubre. Una parte significativa de las áreas planificadas para cereales de invierno se sembrará en noviembre. Existe una alta probabilidad de que los cultivos de noviembre no puedan alcanzar la fase de ahijamiento, la fase adecuada para la invernada, al finalizar su vegetación otoñal.

Durante la mayoría de los días de noviembre, se pronostican temperaturas medias diarias superiores a lo normal, lo que mantendrá los procesos de vegetación activos en los cultivos de otoño. A finales de mes, se observarán diferentes fases en trigo y cebada, dependiendo de las fechas de siembra. Para los cultivos sembrados en noviembre, se producirá la germinación y la formación de hojas (1-2-3 hojas). En una pequeña parte de los cultivos de trigo en algunas zonas de la llanura del Danubio y en las regiones orientales (Dobrich, General Toshevo, Tervel, Provadia, Karnobat), que fueron sembrados a principios de otoño, se observará el inicio de la fase de ahijamiento.



La plaga más peligrosa de los cultivos de cereales es el carábido terrestre común de los cereales (Zabrus tenebrioides), que ataca el trigo, la cebada, el maíz, la avena y varias gramíneas forrajeras.

En las fases iniciales de la vegetación del trigo y la cebada, se deben inspeccionar los cultivos en busca de plagas. Los daños son causados por el topillo común, las larvas del carábido terrestre de los cereales y las moscas de los cereales, y si la densidad supera el NDE (Nivel de Daño Económico), es necesaria una protección fitosanitaria oportuna.



En noviembre, se crearán condiciones más adecuadas para la plantación de árboles frutales y para la realización de actividades fitosanitarias en cultivos frutales durante la segunda decena. Para las especies de frutas de pepita (manzana, pera) afectadas por la sarna, se recomienda el tratamiento con una solución de urea al 5%. Para las especies de frutas de hueso, se aconseja pulverizar con una mezcla bordelesa al 2% contra los agentes causantes de la cribado, la monilia temprana y el abolladura del melocotonero.