

Diciembre – temperaturas inusualmente altas y precipitación localizada

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



El tiempo cálido para la estación durante la mayor parte de noviembre y la presencia de muy buenas reservas de humedad en el suelo crearon condiciones para el progreso en el desarrollo de los cultivos de otoño sembrados tardíamente, después de los plazos agrotécnicos.

A principios de diciembre, las temperaturas pronosticadas por encima de lo normal prolongarán los procesos de vegetación de los cereales de invierno en las regiones de campo del país.

Las precipitaciones generalizadas a principios del período aumentarán el nivel de las reservas de humedad de otoño en la capa de suelo de 100 cm. Debido a las lluvias por encima de lo normal en octubre y noviembre, las

reservas de humedad del suelo en la capa de un metro para los cereales de invierno en la mayoría de las regiones de campo han alcanzado niveles de hasta el 90% de la CC (capacidad de campo).

Al final del período de diez días, las condiciones agrometeorológicas seguirán estando determinadas por las altas temperaturas para la estación. En las regiones orientales, se pronostican valores máximos de más de 14-15°C, con probabilidad de provocar una hinchazón indeseable y prematura de los brotes en algunas especies frutales de floración temprana, lo que conduciría a una reducción de su resistencia a las heladas.

Durante la segunda mitad del primer decenio del mes se crearán condiciones adecuadas para completar las pulverizaciones otoñales de protección fitosanitaria en frutales contra patógenos y plagas hibernantes.

Se espera una disminución de las temperaturas, atenuación y cese de la vegetación para el trigo y la cebada a finales del primer decenio de diciembre.

Durante el segundo y principios del tercer decenio, las temperaturas medias diarias pronosticadas superarán las normas climáticas, pero se mantendrán dentro de los límites que mantendrán los cereales de invierno en letargo.

A principios de invierno, predominará la fase de tres hojas para el trigo. Una pequeña parte de los cultivos en algunas regiones orientales y del extremo sur del país, que fueron sembrados a tiempo – en octubre, estarán en la fase de ahijamiento, apta para la invernada. Los cereales de invierno sembrados tardíamente, durante la segunda mitad de noviembre, entrarán en invierno sin desarrollar, en la etapa inicial de formación de hojas (1-2 hojas). La razón de las significativas diferencias en el estado fenológico de los cultivos es la siembra tardía debido a condiciones desfavorables al comienzo del otoño – después de la sequía y las posteriores lluvias de octubre por encima de lo normal.

Hacia finales de diciembre se espera un aumento de las temperaturas, pero sus valores medios diarios se mantendrán por debajo del mínimo biológico necesario para la reanudación de los procesos de vegetación en los cultivos de otoño.

Durante el mes, las temperaturas mínimas pronosticadas, hasta menos 10°C, en condiciones sin cubierta de nieve, si se mantienen durante un período más prolongado, serán críticas para los cultivos en la etapa inicial de formación de hojas.

Las precipitaciones esperadas en diciembre, cercanas a la norma mensual, aumentarán las reservas de humedad en la capa de suelo de 100 cm a niveles cercanos a la CC (capacidad de campo).

