

Enero – las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima dinámico con precipitaciones significativas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 31.12.2025 Брой: 12/2025



En enero, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un clima dinámico, con períodos alternos de temperaturas subnormales, superiores a lo normal y cercanas a las normas climáticas.

Los valores diarios promedio pronosticados en la mayoría de las regiones de campo estarán dentro de los límites que mantendrán inactivas las cosechas de otoño y las plantaciones perennes. Se esperan excepciones en las regiones del sur y a lo largo de la costa del Mar Negro a mediados del primer decenio. En estas regiones, se pronostica un aumento significativo de las temperaturas hasta y por encima de 10-15°C y una

reanudación a corto plazo de los procesos de vegetación en los cultivos de cereales de invierno, pero no provocarán un cambio en el estado fenológico de los cultivos.

En enero, el trigo hibernará en diferentes fases fenológicas. Predominan los cultivos en fase de tercera hoja. En fase de ahijamiento, la fase adecuada para la hibernación, se encuentran los cultivos de cereales de invierno en partes de las regiones oriental y suroeste del país (Silistra, Provadia, Dolen Chiflik, Karnobat y Sandanski). En algunos lugares del noroeste de Bulgaria, en la agroestación de Nikolaevo, los cultivos se encuentran en fase de germinación y formación inicial de hojas. No son fuertes y serán los más vulnerables al impacto de las bajas temperaturas de enero. Los valores mínimos pronosticados, del orden de menos 15 - 18°C, en condiciones sin capa de nieve y de duración prolongada, serán críticos para los cultivos de cereales de invierno que no hayan ahijado. Valores por debajo de menos 16 - 17°C también serán peligrosos para las yemas de las variedades de uva de postre menos resistentes al frío.

Durante el mes, la precipitación esperada, cercana a las normas climáticas, aumentará las reservas de humedad del suelo en las capas de un metro y dos metros. Al comienzo del invierno, el nivel de reservas de humedad en la capa de suelo de 100cm para los cultivos de otoño en la mayoría de las regiones de campo es muy bueno – más del 90% de la capacidad de campo.