

En febrero, las condiciones agro-meteorológicas variarán del invierno a la primavera.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 *Брой:* 2/2026



Tras el tiempo estacional suave de finales de enero y principios de febrero, las condiciones agrometeorológicas volverán a adquirir un carácter invernal.

El enfriamiento previsto restablecerá la latencia en los cultivos sembrados en otoño en las regiones meridionales y orientales y frenará la hinchazón prematura de las yemas en algunas especies de frutales de hueso de floración temprana.

Las precipitaciones de nieve previstas formarán una capa de nieve, que proporcionará protección a los cultivos de cereales de invierno sembrados tardíamente frente a las bajas temperaturas mínimas pronosticadas, de

hasta menos 11-12°C. Estos valores, en ausencia de capa de nieve y con una duración más prolongada, son críticos para parte de los cultivos en hibernación en la fase de 1-2 hojas (Estación Agrícola de Nikolaevo).

Durante la segunda mitad de la primera y a lo largo de la segunda decena, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas alrededor y por encima de las normas climáticas. En la mayoría de las regiones de campo, excepto en zonas del sur de Bulgaria y a lo largo de la costa del Mar Negro, las temperaturas medias diarias pronosticadas no superarán el mínimo biológico necesario para la reanudación de los procesos vegetativos en los cultivos de cereales de invierno.

Durante la tercera decena de febrero, se pronostica un aumento sustancial de la temperatura, y se crearán condiciones para una vegetación retrasada en los cultivos sembrados en otoño en las regiones orientales y meridionales. Para finales de mes, predominará la fase de tercera hoja en el trigo. Parte de los cultivos en la Llanura Danubiana, en las regiones extremorientales y suroccidentales (Novachene, Silistra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanski) están invernando en la fase de ahijamiento.

Se espera que las temperaturas por encima de lo normal durante la tercera decena provoquen un desarrollo prematuro también en algunas especies de frutales de hueso de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero) en las regiones meridionales del país.

En febrero, las precipitaciones superiores a lo normal previstas aumentarán las reservas de humedad del suelo en la capa de dos metros. Las reservas de humedad en la capa de un metro de suelo a finales de enero en la mayoría de las regiones de campo, excepto en zonas del este de Bulgaria (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Sliven, Chirpan), alcanzaron niveles de hasta Capacidad de Campo.

En febrero, se crearán condiciones más adecuadas para llevar a cabo la poda en viñedos y plantaciones frutales durante la segunda mitad del mes, y para el abonado de cobertera de los cultivos sembrados en otoño con fertilizantes minerales nitrogenados y para realizar la labranza previa a la siembra en áreas destinadas a la siembra con cultivos de primavera temprana (guisantes, veza, avena, cebada de primavera) – durante la tercera decena.

Plazos para la Prohibición de Fertilizantes que Contienen Nitrógeno

No olvide los períodos durante los cuales está prohibida la aplicación de fertilizantes que contienen nitrógeno para cultivos de campo y permanentes, plantaciones frutales, prados y pastos permanentes según la Ley de Aguas 2 "Protección de las Aguas contra la Contaminación por Nitratos de Fuentes Agrícolas". Este requisito es

particularmente importante para los beneficiarios de las medidas "Agroecología y Clima" y "Agricultura Orgánica", así como para todos los agricultores cuyas tierras se encuentren dentro del ámbito de las zonas vulnerables a nitratos. Están obligados a cumplir con la Directiva de Nitratos y las reglas de la buena práctica agrícola.

Según los requisitos, existen períodos específicos durante los cuales está prohibida la aplicación de fertilizantes que contienen nitrógeno:

- Para el sur de Bulgaria, este es el período del 1 de noviembre al 20 de febrero y cubre los distritos de Blagoevgrad, Burgas, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Sofía-ciudad, Sofía-provincia, Pernik y Kyustendil;
- Para el norte de Bulgaria, el período es del 1 de noviembre al 25 de febrero e incluye los distritos de Varna, Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pleven, Razgrad, Ruse, Silistra, Targovishte y Shumen;
- Del 1 de noviembre al 5 de febrero, no se permite la fertilización de cultivos anuales sembrados en otoño;
- Del 1 de noviembre al 25 de febrero – en áreas vacantes preparadas para la siembra y plantación de cultivos;
- Al establecer nuevas plantaciones frutales, no se aplican fertilizantes que contienen nitrógeno del 15 de noviembre al 25 de febrero.

La norma anual para fertilizantes que contienen nitrógeno, incluidos los orgánicos y minerales (inorgánicos), es de hasta 17 kilogramos de sustancia activa por decárea. Los agricultores están obligados a llevar registros de fertilización, en los que se anotan la dosis de fertilización, el nombre, tipo y cantidad de los fertilizantes aplicados, así como los resultados de los análisis previos del suelo y las recomendaciones de los especialistas en fertilización.