

A principios de marzo, el alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo dificultará la siembra de los cultivos de primavera temprana.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026



Durante la primera decena de marzo, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas superiores al promedio. El tiempo cálido pronosticado para el inicio del mes, con valores máximos por encima de los 15-16°C, activará los procesos vegetativos en los cultivos de otoño y en los frutales en las regiones de campo del país. Durante este período, prevalecerá la etapa de tres hojas en los cultivos de trigo en las regiones del noroeste, mientras que en las regiones orientales y meridionales dominará la etapa de ahijamiento.

En los frutales, sin peligro de temperaturas mínimas críticas, se producirán las etapas de hinchazón de yemas y brotación en las especies de fruta de hueso de floración temprana en las regiones del sur.

No se esperan precipitaciones significativas durante el período. Debido a las precipitaciones superiores al promedio en febrero, las reservas de humedad del suelo en la capa de 100 cm en la mayoría de las regiones de campo han alcanzado niveles de Capacidad de Campo. En partes de las regiones del sur, donde las precipitaciones superaron dos a tres veces las normas mensuales (Sliven - 111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 150 l/m², Elhovo - 121 l/m², Chirpan - 118 l/m²), los cultivos de cereales de invierno están sobresaturados.



En el próximo período también, el alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo en muchos lugares del sur de Bulgaria dificultará la fertilización de cobertera de los cultivos de otoño con fertilizantes minerales nitrogenados y la realización de la labranza previa a la siembra en las áreas destinadas a cultivos de primavera temprana (veza, guisantes, cebada de primavera).

Tras el esperado breve enfriamiento al final de la primera decena, para la mayoría de los días de la segunda, se pronostican temperaturas diarias promedio por encima del mínimo biológico necesario para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.



Durante la tercera decena de marzo, el desarrollo de los cultivos agrícolas procederá bajo temperaturas cercanas a las normas climáticas. Hacia finales de mes, prevalecerá la etapa de ahijamiento en el trigo. En los cultivos de cereales de invierno sembrados dentro del plazo agrotécnico, se observará un aumento en el coeficiente de ahijamiento.

Durante marzo, ocurrirán las siguientes fases en los frutales: hinchazón, brotación de yemas frutales, formación de botones florales y floración en especies de fruta de hueso de floración temprana (almendro, albaricoquero, melocotonero, cerezo). Las temperaturas mínimas pronosticadas durante el mes, de hasta menos 7°C, serán críticas para los frutales que hayan entrado en las fases de formación de botones florales y floración.

Las precipitaciones esperadas en marzo, cercanas a las normas mensuales, mantendrán buenas reservas de humedad del suelo para los cultivos de cereales de invierno. Debido a las precipitaciones superiores al promedio en febrero (Shumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrich - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Chirpan - 119 l/m²), las reservas de humedad en la capa de 100 cm del suelo para los cultivos de otoño han alcanzado niveles cercanos a la Capacidad de Campo.

A mediados de marzo, comienza el período agrotécnico (15-20.03) para la siembra de girasol en el sur de Bulgaria, y a mediados de la tercera decena (25.03-5.04) – en la Llanura Danubiana.