

'Enfermedad peligrosa de la vid: BABH introduce medidas de cuarentena'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2026 Брой: 3/2026



La Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria (BFSA, por sus siglas en inglés) ha puesto bajo cuarentena 20,66 hectáreas en una zona vitícola de la región de Veliko Tarnovo. Se ha establecido una zona de amortiguamiento de aproximadamente 140 hectáreas a su alrededor por un período de un año. La medida se tomó debido a la peligrosa enfermedad fitoplasmática (*Grapevine flavescence dorée*) - el agente causal de la flavescencia dorada de la vid. La presencia del patógeno fue confirmada mediante pruebas moleculares en el Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal de la BFSA tras un informe de un instituto de investigación y del propietario de la plantación.

La enfermedad se propaga a través de material de plantación infectado y mediante un vector (portador) – la chicharrita americana de la vid (*Scaphoideus titanus*), que se alimenta de la savia de la vid y puede transmitir el patógeno de plantas infectadas a plantas sanas.

Se ha establecido una organización para erradicar el brote identificado.

Durante el próximo año, se llevarán a cabo inspecciones completas de las plantaciones de viñedos en el área, se tomarán muestras, se realizarán análisis de laboratorio y se realizará un monitoreo para detectar la presencia del vector de la enfermedad. El objetivo de las medidas es limitar oportunamente la enfermedad y proteger el sector vitivinícola del país.

La enfermedad está considerada como una de las más peligrosas para las vides en Europa. Puede conducir a una reducción en los rendimientos de hasta un 50 por ciento y a la desecación gradual de las plantas de vid. Debido al alto riesgo de infección, el fitoplasma está clasificado como una plaga de cuarentena en la Unión Europea y está sujeto a un estricto control fitosanitario.

El Programa Nacional de Medidas para Prevenir la Propagación y Control de Plagas en Vides (género *Vitis*) presta especial atención a los "vectores" - organismos que transmiten y propagan patógenos de enfermedades vegetales (virales, fitoplasmáticos), como la chicharrita americana de la vid (*Scaphoideus titanus*), vector del fitoplasma de la Flavescencia dorée-PHY64, agente causal de la Flavescencia dorada de la vid. El fitoplasma está incluido en el Anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072, en la "Lista de plagas de cuarentena de la Unión y sus códigos respectivos"; Parte B – "Plagas cuya presencia se conoce en el territorio de la Unión". La chicharrita americana de la vid, vector del fitoplasma, se ha establecido en el territorio de Bulgaria. Algunos países europeos (Francia) ya implementan programas de tratamiento insecticida obligatorio o arranque sanitario de vides, con el objetivo de limitar la propagación de la flavescencia dorada de la vid (fitoplasma de la Flavescencia dorée).



Chicharrita americana de la vid (Scaphoideus titanus) – adulto

Las ninfas y los individuos adultos de la chicharrita americana de la vid (*Scaphoideus titanus*) adquieren el fitoplasma de la Flavescencia dorée mientras se alimentan de las hojas de plantas infectadas. El período de latencia después de la adquisición es de 4-5 semanas, después de lo cual la chicharrita transmite la Flavescencia dorée por el resto de su vida. La especie desarrolla una generación por año e inverna como huevo en los sarmientos. Las ninfas eclosionan en abril. Se alimentan (chupan la savia) de las hojas y de las puntas verdes jóvenes de los brotes de los sarmientos.

Los adultos aparecen en julio. La cópula ocurre en agosto, y la puesta de huevos en los sarmientos tiene lugar en septiembre.

Desde principios de mayo hasta finales de junio (dependiendo de las condiciones meteorológicas), se realizan inspecciones de las plantaciones de viñedos para buscar larvas de *Scaphoideus titanus*. Son ápteras y saltadoras. Se pueden encontrar exuvias (mudas) larvarias en el envés de las hojas. Se utiliza una lupa durante la inspección.

Período para colocar trampas adhesivas amarillas – desde principios de julio hasta finales de septiembre. Las trampas se colocan y revisan cada dos semanas, es decir, en tres meses hay seis

rondas de colocación y revisión.

Foto destacada e información: BFSA

Más sobre el tema:

El Programa Nacional de Medidas para Prevenir la Propagación y Control de Plagas en Vides (género Vitis) - una guía importante para todos los viticultores y agrónomos especialistas