Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

En octubre: ¿Cómo serán las condiciones agrometeorológicas y cuándo son las fechas óptimas de siembra?

Растителна Защита

Fecha 09.10.2026 | **Número** 10/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** ES
www.plant-protection.com/article/2478?lang=es



Durante los primeros diez días de octubre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y temperaturas medias diarias en torno a las normas climáticas y por debajo de ellas. El pronóstico de tiempo fresco y húmedo en la mayoría de los días del período será un requisito previo para el desarrollo de patógenos: podredumbre marrón tardía en los frutos de las variedades otoñales de árboles frutales (Monilia fructigena), moho gris (Botrytis cinerea) en la cosecha de uva no recolectada. Se esperan heladas masivas al final del período de diez días, lo que requiere la recolección oportuna de los cultivos de hortalizas sujetos a las heladas.



Podredumbre marrón tardía en los frutos de las variedades otoñales de árboles frutales (Monilia fructigena)

Durante los primeros diez días de octubre, se pronostican precipitaciones, mejora del estado de las capas superiores del suelo y de las condiciones para llevar a cabo la labranza estacional del suelo. La sequía al final del verano dificultó la realización de la labranza

ISSN 2815-522X

presiembra de las áreas destinadas a la siembra de cultivos de invierno. Por esta razón, se han perdido los plazos agrotécnicos de septiembre para la siembra de colza de invierno.



Octubre es el momento óptimo para la siembra de cereales de invierno. Durante los primeros diez días es el plazo agrotécnico para la siembra de trigo en el norte de Bulgaria, del 15 al 25 de octubre, en el sur de Bulgaria, y a finales de mes – en las zonas a lo largo de la costa del Mar Negro.

Las condiciones agrometeorológicas en el período del 9 al 16 de octubre serán dinámicas. Al comienzo de este período de siete días, las temperaturas medias diarias previstas estarán por encima de lo normal, y durante el resto del mismo se mantendrán dentro de las normas climáticas. Al inicio del período, se pronostican precipitaciones locales y ligeras en el oeste de Bulgaria, y hacia la mitad también en las zonas de campo de Bulgaria central y oriental. En algunos lugares las cantidades serán significativas, lo que mejorará la humedad de las capas superiores del suelo. No se esperan condiciones para la formación de heladas.

Con excepción de algunas zonas del oeste de Bulgaria, durante la primera mitad del período de pronóstico, las condiciones agrometeorológicas serán adecuadas para la cosecha final de las plantaciones de uva y frutales, la limpieza de las áreas de cultivos en hileras y hortalizas tardías, así como para la recogida de forraje y remolacha azucarera, que se encuentran en la fase de madurez tecnológica. Las condiciones serán adecuadas para llevar a cabo actividades agrotécnicas relacionadas con la siembra de cereales de invierno. En caso de fuerte infestación de malas hierbas en las áreas, es aconsejable realizar la aplicación otoñal de herbicidas.



Hasta mediados del período, las condiciones agrometeorológicas permitirán la aplicación de fertilizantes minerales y orgánicos, así como la plantación previa al invierno de cebollas para verdeo, ajo de invierno, lechuga y espinaca.

Las lluvias previstas durante la segunda mitad del período de pronóstico limitarán en gran medida las posibilidades de llevar a cabo actividades agrícolas.

Durante el segundo y tercer período de diez días, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por temperaturas cercanas a las habituales. Las precipitaciones previstas durante la primera mitad del segundo período de diez días, al comienzo del tercero y al final del mes, mejorarán las reservas de humedad del suelo en la capa de 50 cm y las condiciones para el curso de las fases iniciales de la vegetación de los cultivos de invierno sembrados. A finales de octubre, en el trigo y la cebada, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán las fases de emergencia y formación de 1-2-3 hojas.



En octubre, los cultivos otoñales son atacados por plagas. En los cereales de invierno, debe monitorearse la presencia de topillo común, carábido del trigo y moscas del trigo. Cuando el número de plagas

ISSN 2815-522X

supere el umbral económico de daño (UED), es necesario un tratamiento oportuno. Para el topillo común, el UED es de 2 colonias activas por decárea, para el carábido común del trigo: 3 larvas/m².