Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

'Durante la segunda quincena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas permitirán la finalización de las siembras otoñales, la plantación de árboles frutales y la realización de actividades fitosanitarias en los huertos.'

Растителна Защита

Fecha 13.12.2026 | **Número** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** ES
www.plant-protection.com/article/2491?lang=es



La mayoría de los días durante la primera quincena de noviembre, las condiciones agrometeorológicas estarán determinadas por un tiempo inestable y estacionalmente frío. Durante este período, se prevén precipitaciones superiores a lo normal, que en muchas partes del país retrasarán la siembra de trigo y cebada. La sequía a principios de otoño dificultó la realización de la labranza presiembra de las áreas y por esta razón, en gran parte de las regiones de campo, se incumplieron los plazos agrotécnicos de octubre para la siembra de los cultivos de cereales de invierno.

Hasta mediados de noviembre, el desarrollo de los cultivos de invierno sembrados avanzará a un ritmo lento. En los campos altos, donde a principios del mes no se excluyen precipitaciones, incluida nieve, los valores previstos de las temperaturas medias diarias estarán cercanos al mínimo biológico requerido para la vegetación de los cultivos de cereales de invierno.

Las precipitaciones previstas al principio y al final del período (13 - 19.11.2026) mantendrán un alto contenido de humedad en las capas superiores del suelo, lo que retrasará aún más las medidas agrotécnicas de temporada, la más importante de las cuales es la finalización de la siembra de trigo. Las precipitaciones durante la primera decena de noviembre superaron los 60-70 l/m² en muchas partes del país y aumentaron bruscamente las reservas de humedad también en las capas más profundas del suelo. En parte de la Llanura del Danubio, en las regiones oriental y meridional (estaciones agrometeorológicas: Novachene, Nikolaevo, Silistra, Dolni Chiflik, Plovdiv, Haskovo, Yambol, Karnobat), las reservas de hume-

ISSN 2815-522X

dad del suelo en la capa de 50 y 100 cm han alcanzado niveles superiores al 80% de la CC (Capacidad de Campo).

Se espera un aumento de las temperaturas y un cambio positivo en las condiciones agrometeorológicas durante la segunda quincena de noviembre. Durante este período, los procesos de vegetación en los cultivos de otoño avanzarán a temperaturas cercanas a las normas climáticas y con buenas reservas de humedad del suelo. A finales de noviembre, en el trigo y la cebada, dependiendo de las fechas de siembra, se observarán diversas fases. La fase de emergencia y formación inicial de hojas se producirá en los cultivos de noviembre sembrados tardíamente.



En los cultivos de cereales de invierno sembrados en octubre, predominará la fase de tercera hoja (Bazovets, Silistra, Provadia, Karnobat). Durante el mes, no se prevén temperaturas mínimas críticas para los cultivos agrícolas.



Durante la segunda quincena de noviembre, no se esperan precipitaciones significativas y las condiciones permitirán la finalización de las siembras de otoño, la plantación de árboles frutales y la realización de actividades fitosanitarias en los huertos.



Durante el mes, debe continuar el monitoreo de los cultivos de otoño para detectar plagas. A finales de octubre, se estableció una población aumentada del topillo común y en noviembre, si la población de la plaga supera el umbral económico (más de 2 colonias activas por decárea), es necesario realizar el tratamiento de las áreas con los rodenticidas autorizados.