

Moho velloso de la vid (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



Dependiendo de la edad de las hojas, el mildiu forma dos tipos de manchas: aceitosas y en mosaico. En su lado inferior se forma un recubrimiento blanco esporulante. En ataques severos, las hojas se secan y caen prematuramente. En condiciones favorables (humedad relativa del aire superior al 75%) aparecen manchas cloróticas en las inflorescencias y racimos, sobre las cuales también se forma un recubrimiento blanco esporulante. Cuando las manchas están en la base del racimo, todo el racimo se seca. La infección de las bayas cesa cuando, para las variedades de uva vinífera, alcanzan el tamaño de un "*guisante*", y para las variedades de uva de mesa el tamaño de un "*haba*".

Estrategia de control de plagas:

El tratamiento se lleva a cabo cuando se dan condiciones favorables para la infección (temperatura del aire superior a 13°C y lluvias frecuentes pero ligeras) y durante la etapa fenológica sensible de la vid "*floración*" - "*guisante*".

Productos fitosanitarios autorizados:

acrobate r – 0,25%; acrobate plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; anthracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banco 500 – 0,2%; caldo bordelés 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha aplicado en mezcla en tanque con productos que contienen folpet; dimix 500 sc - 30 ml/ha aplicado en mezcla en tanque con productos que contienen mancozeb; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%- intervalo de tratamiento 7-10 días - 0,2% cada 10-14 días; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l de agua; corseit r df – 0,25%; corseit r wp – 0,25% hasta 09.2017; corseit max wp – 0,15%; cuadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% hasta 06.2017; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; oxiclورو de cobre 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha hasta 06.2017; mical flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sancozeb 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobilurin df /discus df - 0,015 % +acrobate mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % +ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.