

Cuidado de protección vegetal para la vid en mayo

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 14.05.2017 Брой: 5/2017



Durante este período, las vides se encuentran en la fenofase „aparición de las primeras inflorescencias” a „floración plena”.

Principales plagas para el período

Mildiu de la vid *Plasmopara viticola*

Oídio *Oidium tuckeri*

Podredumbre gris *Botrytis cinerea*

Ácaro de la eriosis de la vid *Eriophyes vitis*

Polilla del racimo *Lobesia botrana*

Enrollador de la hoja de la vid *Sparganothis pilleriana*

Gorgojo enrollador de la hoja de la vid *Byctiscus betulae*

Pulvinaria de la vid *Pulvinaria vitis*

Ácaro amarillo de la vid *Schizotetranychus viticola*

● **Mildiu de la vid**

Dependiendo de la edad de las hojas, el mildiu forma dos tipos de manchas: aceitosas y en mosaico. En su envés se forma un crecimiento blanco de esporulación. Bajo un ataque severo, las hojas se secan y caen prematuramente. En condiciones favorables (humedad relativa del aire superior al 75%), se forman manchas cloróticas en las inflorescencias y racimos, sobre las cuales también se desarrolla un crecimiento blanco de esporulación. Cuando las manchas están en la base del racimo, todo el racimo se seca. La infección de las bayas se detiene cuando, para las variedades viníferas, alcanzan el tamaño de un „guisante”, y para las variedades de mesa el tamaño de una „judía”.

Estrategia para el control de la plaga:

Los tratamientos se realizan cuando se dan condiciones favorables para la infección (temperatura del aire superior a 13°C y lluvias frecuentes pero ligeras) y en una fenofase susceptible de la vid „floración” - „tamaño de guisante”.

Productos fitosanitarios autorizados:

acrobat r – 0.25%; acrobat plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0.25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0.075-0.33 kg/ha; alfil wp - 0.075-0.33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; antracol 70 wg – 0.15%; armetil m – 0.25%; armetil-s wp – 0.25%; banco 500 – 0.2%; bordeaux mix 20 wp – 0.5-0.6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0.2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0.15%; galben 8 m 65 – 0.25%; delan 700 wdg – 0.05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha aplicado en mezcla en tanque con productos que contengan folpet; dimix 500 sc - 30 ml/ha aplicado en mezcla en tanque con productos que contengan mancozeb; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0.16%; enervin – 0.2%; cabrio top – 0.15%- intervalo de tratamiento 7-10 días - 0.2% cada 10-14 días; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l de agua; corseyt r df – 0.25%; corseyt r wp – 0.25% hasta 09.2017; corseyt max

wp – 0.15%; quadris 25 sc – 0.075%; cupertine m – 0.3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0.3% hasta 06.2017; cuproset gold m – 0.15%; cuprocin super m – 0.2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0.3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; oxiclорuro de cobre 50 wp – 0.25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha hasta 06.2017; mycal flash – 0.3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha ; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0.2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0.25%; rumba 35 sc – 0.35%; sankozeб 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobi df /discus df - 0.015 % +acrobat mz - 0.15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha ; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187.5 g/ha; folpan 80 wdg - 0.15 % - 0.1 % +ardent 50 sc - 0.015 %; funguran oh 50 wp – 0.15%; shavit f 72 wdg – 0.2%; champion wp/ macc 50 wp /champ wp – 0.155.

● Gorgojo enrollador de la hoja de la vid

Los escarabajos aparecen a principios de mayo. Se alimentan de brotes, flores y hojas. Las hembras roen los pecíolos de varias hojas jóvenes e interrumpen el flujo de savia hacia ellas, después de lo cual las enrollan como un cigarro alrededor de una hoja central cuyo pecíolo no está roído, y en ella ponen varios huevos. La hoja central permanece relativamente fresca y se seca más tarde, y las larvas eclosionadas se alimentan de ella.

Estrategia para el control de la plaga:

Cuando la densidad de población aumenta, se realizan tratamientos contra los adultos antes de la puesta de huevos.

Producto fitosanitario autorizado:

deca ec/ desha ec/ dena ec - 40 - 60 ml/ha;

Se puede encontrar una descripción detallada y el control de enfermedades y plagas para el período en el número 5/2017 de la revista "Protección Vegetal"