

Plaga peligrosa "devasta" el boj

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.05.2017 Брой: 5/2017



Si observa que el boj se está volviendo amarillo, sin duda se enfrenta a un problema grave. Ha sido infestado por la polilla del boj (Cydalima perspectalis). Una plaga peligrosa originaria del este de Asia, entró en Europa en 2007 y se estableció muy rápidamente en varios países: Italia, Rusia, República Checa, Hungría, Suiza, Austria, Bélgica, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Turquía y el Reino Unido, incluida Bulgaria.

Se propaga con el material de plantación, pero incluso si su boj lleva mucho tiempo en su jardín, esto no es garantía de que esta plaga no lo "visite". La razón es que la polilla es capaz de volar largas distancias – 10 km no son un obstáculo para ella. Se considera que el comercio de material de plantación por Internet es una de las vías de introducción de la plaga en Europa.

La plaga es una polilla, generalmente blanca, brillante, con una franja marrón oscuro a lo largo del borde de las alas. Con las alas extendidas, su tamaño es de 4 cm. Las larvas son de color verde claro con marcas negras características con manchas blancas, con pequeños pelos y una cabeza negra brillante.

El daño lo causa la larva. Se alimenta de las hojas del boj, inicialmente por los bordes, y luego las destruye por completo. Al principio, el daño es visible como manchas en las hojas. Detectar las larvas jóvenes es bastante difícil, ya que se alimentan entre las hojas. Por lo tanto, es necesario abrir los arbustos y buscar las larvas en el centro. Después del tercer estadio, también se trasladan a las hojas de la parte superior del boj y pueden notarse más fácilmente. Las pupas son difíciles de detectar (verde claro al principio), porque están escondidas entre las hojas. Los huevos se ponen en racimos, de 1 a 3 mm de tamaño, y están cubiertos por una membrana transparente blanquecina-amarillenta. Durante el día, las polillas se esconden en el boj o en plantas cercanas a él.

Control mecánico

Una medida de control eficaz es la recolección manual de larvas, que debe realizarse cada 2 o 3 días. Para plantaciones más grandes: avenidas, parques, también se pueden utilizar aspiradoras. La polilla del boj se siente atraída por las lámparas ultravioleta – las que se colocan en los jardines para controlar los mosquitos.

Control químico

El uso de insecticidas de contacto (Decis 100 EC) es eficaz, pero no es adecuado en parques y jardines públicos. Los bioinsecticidas a base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* tienen buena eficacia y son respetuosos con el medio ambiente. También puede probar Prev-Gold (aceite de naranja), que es apto para la agricultura ecológica.