

Cuidado de la protección vegetal en julio en viñedos

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Durante este período, las vides se encuentran en la etapa fenológica desde el "fin de la floración" hasta el "inicio de la maduración de la baya" en las variedades tempranas.

Principales plagas para el período

Mildiu de la vid *Plasmopara viticola*

Oídio *Oidium tuckeri*

Podredumbre gris *Botrytis cinerea*

Cáncer bacteriano *Agrobacterium vitis*

Polilla del racimo de la vid *Lobesia botrana*

Polilla de la vid *Theresimima ampellophaga*

Pulgón de la vid *Pulvinaria vitis*

Ácaro amarillo de la vid *Schizotetranychus viticola*

Cáncer bacteriano

En plantas infectadas en las partes leñosas, cerca de la superficie del suelo o inmediatamente debajo de ella, se observan hinchazones (tumores). Las plantas enfermas muestran crecimiento atrofiado, hojas cloróticas y son fácilmente dañadas por el frío durante un invierno severo.

Estrategia para el control de plagas:

En julio, se deben marcar las vides que muestren síntomas de la enfermedad.

Pulgón de la vid

La eclosión de las larvas continúa durante la primera mitad de julio. Causan daños al succionar la savia de las hojas, brotes y racimos. Mudan una vez, se alimentan durante un período determinado, luego abandonan los lugares de alimentación y se trasladan a sus ubicaciones de hibernación. Como resultado del daño, las vides se debilitan.

Estrategia para el control de plagas:

El control químico se lleva a cabo contra las larvas jóvenes.

Producto fitosanitario autorizado:

movento 100 sc - 0.075-0.095%;

