

# Mejorando las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 17.07.2017 Брой: 7/2017



*Tras el tiempo seco y caluroso, se espera un cambio sustancial en las condiciones agrometeorológicas durante el próximo período de siete días. A mediados de julio, se pronostican precipitaciones significativas, un descenso de las temperaturas y una mejora en las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas. Existirá probabilidad de granizo.*

Tras el tiempo seco y caluroso, se espera un cambio sustancial en las condiciones agrometeorológicas durante el próximo período de siete días.

Las temperaturas extremadamente altas y la baja humedad atmosférica a principios de la segunda decena de julio tuvieron un efecto adverso en parte de los cultivos de primavera y causaron la caída de flores y frutos en algunos cultivos hortícolas (tomates, pepinos, calabacines, judías verdes). A diferencia de las regiones del norte y centro, en muchos lugares del sur de Bulgaria las precipitaciones de julio no tuvieron significación económica, lo que llevó a un aumento del déficit de humedad del suelo. En algunas localidades de la Llanura Tracia (las estaciones agrometeorológicas de Pazardzhik, Plovdiv, Sliven) no hay humedad en la capa de suelo de 50 cm, y en la capa de 100 cm las reservas de humedad del suelo son escasas – por debajo del 50–55% de la capacidad de campo.

Durante la primera mitad del próximo período de siete días, se pronostican precipitaciones significativas, un descenso de las temperaturas y una mejora en las condiciones para el desarrollo de los cultivos agrícolas.

Hacia el final de la segunda decena, con temperaturas cercanas a la norma y unas reservas de humedad del suelo mejoradas, continuarán la floración, la fertilización y el llenado de la semilla en el girasol. En el maíz, dependiendo de su precocidad, se observarán diferentes etapas – desde el espigado en los híbridos más tardíos hasta el comienzo de la etapa de madurez lechosa en los híbridos de maíz temprano en algunos lugares de las regiones meridionales del país. En el algodón, se observará el comienzo de la etapa de floración hacia el final del período.

Durante el período, se pronostica nuevamente la probabilidad de granizo y el riesgo de desgrane. Condiciones más adecuadas para llevar a cabo la cosecha del trigo ocurrirán hacia el final de la segunda decena de julio.

En la actualidad, los rendimientos medios de trigo obtenidos son de buenos a muy buenos, superando en muchos lugares del país los 500 kg/da.