

Pronóstico agrometeorológico semanal para finales de julio y principios de agosto

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.07.2017 Брой: 7/2017



A finales de julio y durante los primeros días de agosto, el desarrollo de los cultivos agrícolas se producirá con temperaturas cercanas a las normas climáticas, y en muchas partes del país – con unas reservas de humedad del suelo mejoradas.

Tras las tormentas, granizadas y lluvias torrenciales (Ruse - 45 l/m², Silistra - 43 l/m² y Shumen - 33 l/m²) que cayeron durante los últimos días del período pasado, se espera para el siguiente período una estabilización del tiempo y un cambio en las condiciones agrometeorológicas. El granizo que cayó en muchos lugares del norte de Bulgaria (Vratsa, Polski Trambesh, Troyan, Ruse, Tsarev Brod) una vez más no perdonó los cultivos

agrícolas. Se han causado daños a parte de las parcelas de trigo aún no cosechadas (acame de los cultivos, desgrane de las espigas), así como a los cultivos de primavera, los cultivos hortícolas y los frutales.

Al comienzo del próximo período, a la primera oportunidad, será preferible tratar los cultivos hortícolas, frutales y vides afectados por el granizo con fungicidas que contengan cobre, con el fin de acelerar la cicatrización de las heridas y reducir las infecciones secundarias por patógenos (podredumbre gris en vides, podredumbre parda tardía en los frutos de los árboles frutales, tizón tardío de la papa y *Alternaria* en tomates).

A finales de julio y durante los primeros días de agosto, el desarrollo de los cultivos agrícolas se producirá con temperaturas cercanas a las normas climáticas, y en muchas partes del país – con unas reservas de humedad del suelo mejoradas. Durante el período, en los híbridos de maíz más tempranos, se observará la etapa de madurez lechosa y una transición de madurez lechosa a cerosa en las parcelas en lugares de la Llanura Danubiana y en las regiones meridionales del país. En el girasol, tendrá lugar el llenado de la semilla. A principios de agosto, parte de las parcelas en el sur de Bulgaria entrarán en el inicio de la etapa de maduración.

Durante el período, el mayor contenido de humedad en las capas superiores del suelo retrasará en algunos lugares la finalización de la cosecha de trigo.

Fuente: NIMH-BAS