

Des conditions favorables pour la réalisation des opérations de travail du sol pré-semis et pour l'ensemencement du tournesol seront présentes fin mars.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 24.03.2019 Брой: 3/2019



Au cours de la période à venir, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par des températures supérieures aux normes climatiques pour la troisième décade de mars.

De manière inhabituelle pour le début du printemps, le développement des cultures d'hiver dans une partie des régions de plein champ du pays se déroulera avec des réserves d'humidité du sol insatisfaisantes dans la couche de 50 cm – une conséquence des précipitations inférieures à la normale en fin d'hiver, des températures

de mars supérieures à la normale et de la végétation active en cours des cultures. À la fin de la deuxième décennie de mars, les réserves d'humidité les plus faibles dans la couche de 50 cm, mesurées en blé, ont été enregistrées par endroits dans les régions méridionales et sud-est du pays, en dessous de 65% de la capacité au champ. Les meilleures réserves d'humidité, supérieures à 85–90% de la capacité au champ, sont signalées pour les cultures d'hiver dans les parties nord-ouest de la plaine danubienne.

Vers la fin de la période, une baisse des températures et un changement des conditions agrométéorologiques sont attendus. Les valeurs prévues des températures minimales, localement jusqu'à moins 2°C, présentent un risque pour la floraison et la nouaison des espèces à noyau avancées dans leur développement, surtout si les basses températures persistent longtemps.

D'autres précipitations sont attendues et les conditions pour la germination des cultures de printemps semées s'amélioreront.

Pour le blé, le stade de croissance du tallage sera observé à grande échelle, et en certains endroits des régions du nord-est (Tsarev Brod, Dolni Chiflik) – le début de la montaison. Pour le colza, la formation de la ramification sera en cours.

Pendant la plupart des jours de la période, les conditions seront propices à l'exécution du travail du sol pré-semis et au semis du tournesol. Au cours de cette période, le délai optimal pour le semis du tournesol en Bulgarie du Sud expire. Au milieu de la troisième décennie de mars, la fenêtre agrotechnique pour le semis du tournesol dans la plaine danubienne commence (25.03–05.04).

Source : NIMH