

Protection phytosanitaire de la vigne

Автор(и): Растителна защита
Дата: 30.03.2019 Брой: 3/2019



Principaux ravageurs pour mars et avril

Excoriose de la vigne *Phomopsis viticola*

Acarien rouge *Panonychus ulmi*

Eudémis de la vigne *Lobesia botrana*

Excoriose de la vigne

L'agent causal de la maladie hiverne sous forme de fructifications dans l'écorce des rameaux aoûtés et sous forme de mycélium dans les bourgeons et le bois. La période critique pour le développement de la maladie s'étend du stade phénologique de la vigne "débourrement" au stade "3-4 feuilles", combinée à une météo modérément chaude et une humidité de l'air supérieure à 98-100%. Les symptômes de la maladie se manifestent par la mort des bourgeons primaires, l'allongement des bras et leur dépérissement.

Stratégie de lutte

Un traitement avec des produits phytopharmaceutiques est obligatoire si la maladie a été détectée dans les vignobles l'année précédente. Un premier traitement indépendant est effectué lorsque environ 40% des bourgeons situés à la base des rameaux sont au stade "pointe verte". Au printemps frais et pluvieux, lorsque la période sensible à l'excoriose est prolongée, un second traitement est réalisé lorsque 30 à 40% des bourgeons à la base des rameaux sont au stade "2-3 feuilles".

Produits phytopharmaceutiques autorisés

Verita WG - 0,2 % ; Mikal Flash - 0,3 % ; Momentum Extra WG - 300 g/ha ; Pencozeb 75 WG - 210 g/ha ; Solofol - 188 g/ha ; Thiovit Jet 80 WG - 1250 g/ha ; Folder 80 WG - 187,5 g/ha ; Follow 80 WG / Friller 80 WG / Flowet 80 WG - 187,5 g/ha ; Delan 700 WDG - 0,2 % ; Kumulus DF - 750 g/ha.

Acarien rouge

Les larves, nymphes et acariens adultes causent des dégâts en suçant la sève et les grains de chlorophylle des bourgeons en développement et de la face inférieure des feuilles. Ils sécrètent des enzymes qui dégradent les pigments des feuilles. Suite aux dégâts, la couleur du limbe foliaire change légèrement. De loin, les feuilles apparaissent gris-brun et présentent une marge enroulée vers le haut.

Stratégie de lutte

Le traitement est effectué jusqu'au stade "débourrement" et au début de l'éclosion des œufs.

Produits phytopharmaceutiques autorisés

Para Sommer - 3 % ; Zoom 11SC - 12,55 ml/ha ; Ovipron TOP EC – 2500–3500 ml/ha ; Thiovit Jet 80 WG - 2000 g/ha.

Eudémis de la vigne

Le vol des papillons de la génération hivernante commence lorsque la température moyenne quotidienne de l'air, sur une période d'environ dix jours, dépasse 10–12 °C.

Stratégie de lutte

En mars et avril, pour surveiller le vol et le nombre de papillons attirés de la première génération du ravageur, des pièges à phéromones sont accrochés sur le palissage dans les vignobles (1 piège pour 25–30 ha de vignes).