

Le temps humide pendant la première quinzaine de mai est une condition préalable au développement des agents pathogènes fongiques.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2019 Брой: 5/2019



Le temps humide créera des conditions propices à l'apparition et au développement d'agents pathogènes fongiques, dont la prévention nécessite l'application de fongicides systémiques.

Pour la période du 3 au 9 mai, des conditions agrométéorologiques dynamiques et variables sont prévues. Les processus de végétation des cultures agricoles se dérouleront avec des températures moyennes inférieures aux normes climatiques et des précipitations fréquentes, selon les prévisions synoptiques.

Dans la première moitié de la période, des précipitations sont attendues, en de nombreux endroits dans les zones de plaine du pays également intenses, ce qui maintiendra les réserves d'humidité du sol améliorées après la sécheresse du début du printemps surmontée. Le temps venteux prévu limitera en outre les possibilités de mener des activités de protection des plantes dans les peuplements de céréales d'hiver, de colza et dans les plantations fruitières permanentes.

Pendant cette période, le blé sera aux stades de montaison, de transition entre la montaison et l'épiaison, et d'épiaison. Pour le colza, on observera la floraison, la formation et la croissance des siliques. Dans les cultures de printemps semées, la formation des feuilles aura lieu.

Le temps humide créera des conditions propices à l'apparition et au développement d'agents pathogènes fongiques, dont la prévention nécessite l'application de fongicides systémiques.

À la fin de la période, une amélioration des conditions agrométéorologiques est prévue (début d'augmentation des températures, affaiblissement du vent, faible probabilité de précipitations) et la création d'opportunités plus favorables pour la réalisation des activités agrotechniques.

Source : NIMH