

Prévision agrométéorologique pour le mois de mai

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.05.2019 Брой: 5/2019



Début mai, le développement des cultures agricoles se poursuivra sous des températures inférieures à la normale et avec de bonnes réserves d'humidité du sol résultant des précipitations supérieures à la normale en avril. Les précipitations d'avril (Pleven - 116l/m², Veliko Tarnovo - 63l/m², Lovech – 125l/m², Razgrad - 64l/m², Dobrich - 60l/m², Sofia - 78l/m², Sandanski - 58l/m², Pazardzhik - 60l/m², Plovdiv - 58l/m², Haskovo - 89l/m², Kardzhali - 75l/m², Elhovo - 79l/m², Stara Zagora - 55l/m², Karnobat - 52l/m²), après la sécheresse du début du printemps, ont été décisives pour surmonter le déficit d'humidité du sol dans les cultures semées à l'automne. Les précipitations prévues au cours de la première décade de mai maintiendront un très bon niveau de réserves d'humidité dans les couches de sol de 50cm et 100cm, au-dessus de 85% de la capacité au champ (CC). Ces

précipitations auront un effet bénéfique sur les céréales d'hiver et le colza, qui sont au stade reproductif de leur développement, avec des besoins accrus en humidité du sol. Durant cette période, dans les régions de plaine du pays, le blé et l'orge connaîtront le stade de montaison, la transition de la montaison à l'épiaison, et le stade d'épiaison. Pour le colza, la floraison, la fécondation et la formation des siliques auront lieu.

À la fin de la première décade, des gelées au sol sont prévues dans les champs en altitude, ce qui doit être pris en compte lors du repiquage des plants de légumes et de tabac. Une amélioration substantielle des conditions thermiques et une accélération des processus de végétation dans les cultures agricoles sont attendues durant la première moitié de la deuxième décade.

Durant la seconde moitié de mai, les conditions agrométéorologiques resteront instables, avec des précipitations fréquentes. Le développement des cultures agricoles se poursuivra à des températures proches et supérieures aux normes climatiques. Durant cette période, la formation et le remplissage des grains dans les céréales d'hiver se dérouleront sous des réserves d'humidité du sol très bonnes et optimales. À la fin de la troisième décade, dans les régions du sud et localement dans la plaine danubienne, le début du stade laitieux sera observé pour le blé et l'orge. Au cours du mois, la formation des feuilles se produira chez le maïs et le tournesol. Fin mai, pour le tournesol semé dans les délais agrotechniques, la formation de l'inflorescence sera observée. Les précipitations fréquentes en mai créeront des conditions propices à l'augmentation du potentiel infectieux d'un certain nombre de maladies fongiques : chez le blé, les rouilles (brune, jaune) et la fusariose de l'épi ; les mildious chez les cultures légumières et la vigne ; la pourriture brune précoce et la criblure chez les fruits à noyau, la tavelure chez les fruits à pépins, etc. Au cours du mois, des conditions plus favorables pour réaliser les traitements phytosanitaires se présenteront au milieu de la première, dans la première moitié de la deuxième, et durant la troisième décade.

En mai, une probabilité accrue de grêle est prévue. En cas de dommages partiels par la grêle, il est conseillé de traiter les cultures affectées dès que possible avec des fongicides à base de cuivre pour une cicatrisation plus rapide des blessures et une réduction du risque d'infections secondaires.

Source : INMH