

Maladies et ravageurs du fraisier et du framboisier en mai

Автор(и): проф. д.с.н Иванка Лечева; проф. Мария Боровинова

Дата: 24.05.2019 Брой: 5/2019



Dans le cas du **framboisier**, les pulvérisations sont dirigées contre la didymella, l'antracnose, le dessèchement des bases des pousses/leptosphaeriose/, la pourriture grise, l'agrite du framboisier, le cécidomyie du framboisier, la galle du framboisier et le scarabée du framboisier. Contre les maladies, l'un des fongicides suivants est utilisé : Dithane M45 – 0,2 %, Kocide 200 WG – 0,12 %, Funguran OH 50 WP – 0,15 % et Cuprozet Gold M – 0,15 %. Pour la lutte contre les ravageurs du framboisier, aucun insecticide n'est inclus dans la liste des produits phytopharmaceutiques autorisés. Selon Tsoleva, 2002, les insecticides Bi-58 – 0,1 %, Karate Zeon – 0,02 %, Vaztak New – 0,015 % et Decis 2,5 EC – 0,04 % sont efficaces contre les ravageurs indiqués. L'auteur recommande que les deux premiers insecticides soient utilisés lors de la première

pulvérisation, et les deux autres lors de la deuxième pulvérisation. En cas d'apparition d'acariens, le NeemAzal TS est appliqué à une concentration de 0,3–0,5 %. Ce bioproduit affecte également les pucerons et les cicadelles.

Les **plantations de fraisiers** en mai sont pulvérisées contre la pourriture grise, l'oïdium, le charançon du fraisier et le charançon de la tige du fraisier. Contre la pourriture grise, l'un des fongicides suivants est utilisé : Switch 62,5 WG – 100 g/ha, Signum WG – 75 g/ha, Synpro SC – 150 ml/ha, Captan – 150 g/ha, Thiram 80 WG – 0,3 %, Shavit F WDG – 0,2 %, Prolectus 50 WG – 80–120 g/ha. Pour protéger le fraisier contre l'oïdium, la pulvérisation est effectuée avec l'un des fongicides approuvés : Systhane 20 EW – 30 ml/ha, Systhane Ecozon EW – 55–130 ml/ha, Cidely Top DC – 10 ml/ha, Ortiva Top SC – 100 ml/ha, Shavit F 72 WDG – 0,2 %, Thiovit Jet 80 WG – 500 g/ha. Parmi les fongicides listés, le Cidely Top DC est également efficace contre la tache blanche des feuilles.

Contre les charançons, on utilise Avant 150 EC – 25 ml/ha ou Calypso 480 SC – 20 ml/ha.