

Prévisions agrométéorologiques pour le mois de juin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2019 *Брой:* 6/2019



La plupart des jours de juin, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable avec des précipitations inégalement réparties, ce qui entraînera également des différences substantielles dans les niveaux de réserve en humidité du sol. En Bulgarie occidentale, où les précipitations de juin, comme en mai, devraient atteindre et dépasser les normes mensuelles, des réserves en humidité du sol très bonnes sont prévues. Pour les cultures de printemps, dans la couche de 50 et 100 cm, elles resteront supérieures à 80% de la capacité au champ (CC). Des niveaux plus bas de réserve en humidité du sol sont attendus dans les régions orientales, où moins de précipitations sont également prévues en juin.

Au cours des première et deuxième décades, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme modéré, sous des températures proches des normes climatiques. Début juin, dans les champs plus élevés, le remplissage des grains aura lieu dans les cultures céréalières d'hiver. Dans le blé des zones de plaine, le stade de la maturité laiteuse sera observé, tandis que dans l'orge – maturité laiteuse et transition vers la maturité pâteuse. Dans le blé, pendant la période interphasique remplissage du grain – maturité laiteuse, les larves de la punaise des céréales (*Eurygaster integriceps*) causent des dégâts sérieux. Durant cette période, les peuplements de blé doivent être inspectés pour la présence du ravageur et, à des densités dépassant le seuil de nuisibilité économique (2 larves/m²), un traitement insecticide est impératif.

À la fin de la première et au début de la deuxième décade, l'orge sera principalement au stade de maturité pâteuse, et le colza sera au stade de maturation.

Au cours de la troisième décade, le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme accéléré, sous des conditions thermiques supérieures à la normale. Dans la première moitié de cette décade, le blé dans les zones de plaine atteindra la maturité pâteuse et la pleine maturité. D'ici fin juin, certaines cultures de printemps entreront dans des stades de développement reproductif – dans le tournesol, le début de la floraison interviendra, et dans les hybrides précoces de maïs – l'épiaison et la floraison de la panicule.

Au cours du mois, les températures maximales prévues, localement jusqu'à 35°C, auront un impact négatif sur la floraison et la fécondation des cultures maraîchères. Les conditions météorologiques en juin maintiendront un fond infectieux élevé d'agents pathogènes fongiques : la pourriture brune tardive chez les cultivars tardifs de cerisier, la tavelure et l'oïdium des arbres fruitiers, les mildious des vignobles et des cultures maraîchères. Dans la vigne, la période interphasique de la floraison des inflorescences à la formation des baies de la taille d'un pois est critique pour l'infection par le mildiou. Au cours de la première décade de juin, une probabilité accrue de grêle est prévue, avec un risque de verse des cultures et de dégâts supplémentaires aux cultures agricoles. Après un orage de grêle, les cultures fruitières et maraîchères affectées doivent être traitées avec des fongicides à base de cuivre dès que possible.

Au cours du mois, des conditions plus favorables pour réaliser le travail du sol en végétation pour les cultures de printemps se présenteront au cours de la troisième décade.