

Augmentation du fond infectieux par des agents pathogènes fongiques dans les cultures maraîchères et fruitières

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.07.2019 Брой: 7/2019



Au cours de la période de sept jours (19 – 25 juillet), le développement des cultures agricoles se poursuivra à un rythme accéléré, sous l'effet de températures supérieures à la normale et, dans une partie des régions du sud, avec de bonnes réserves d'humidité dans les couches de sol de 50 et 100 cm. Les précipitations de la deuxième décade de juillet ont localement dépassé 30-40 l/m² dans le sud de la Bulgarie (Blagoevgrad - 41 l/m², Plovdiv - 34 l/m², Sliven - 56 l/m², Burgas - 40 l/m², Kardzhali - 41 l/m² et Chirpan - 33 l/m²). Ces pluies ont eu un effet bénéfique sur les cultures de printemps, qui sont dans des stades de croissance reproductive avec des besoins en eau accrus.

Durant cette période, le tournesol sera au stade du remplissage des grains. Pour le maïs, différents stades seront observés – de la floraison et de l'épiaison pour les hybrides tardifs au stade de maturité laiteuse pour les hybrides précoces dans les zones de culture du pays. Dans la troisième décade de juillet, les fèves seront au stade de maturation, et le coton entrera en début de floraison.

Pour la période à venir, dans la majeure partie du pays, à l'exception de certains endroits des régions de l'est, un temps relativement sec est prévu, offrant des conditions propices à la réalisation des activités agrotechniques saisonnières, dont la plus importante est l'achèvement de la récolte du blé. Actuellement, les rendements en blé obtenus dans les stations agrométéorologiques du NIMH varient entre 420 kg/daa aux stations de Dolni Chiflik et Karnobat et 650 kg/daa à la station de Glavinitsa.

Pendant cette période, les traitements phytosanitaires doivent être effectués pendant les heures les plus fraîches de la journée avec des produits phytopharmaceutiques présentant un délai avant récolte approprié, en accord avec la période de maturation des cultures. Les précipitations fréquentes de la première quinzaine de juillet ont accru le fond infectieux de certains agents pathogènes fongiques : mildiou sur les cultures maraîchères, pourriture brune tardive sur les variétés fruitières précoces (pêches, nectarines, prunes et poires). Dans la troisième décade de juillet, dans les cultures fruitières, la lutte contre la deuxième génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Dans les vignobles, les traitements contre l'oïdium peuvent être combinés avec ceux contre les acariens et les larves de la deuxième génération de l'eudémis de la vigne.

Source : NIMH