

Prévision agrométéorologique pour août

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2019 Брой: 8/2019



Pendant la plupart des jours de la première décade d'août, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps instable et des températures autour et légèrement en dessous de la norme pour la période. Les conditions météorologiques prévues en début de mois augmenteront le niveau d'infections de certains agents pathogènes fongiques : mildious sur les cultures maraîchères de production tardive de plein champ, pourriture brune tardive dans les vergers, et pourriture grise sur les cépages précoces en maturation.

Les précipitations de fin juillet, qui ont localement dépassé 30-40 l/m² dans les régions du nord-ouest et du centre (N. Selo, Vidin, Vratsa, Montana, Lovech, V. Tarnovo), et les précipitations attendues au cours de la première décade d'août, auront un effet bénéfique sur les deuxièmes cultures et sur les hybrides de maïs plus tardifs, chez lesquels la formation et le remplissage du grain auront lieu. Durant la décade, les hybrides de maïs

mi-précoces seront au stade de la maturité laiteuse, tandis que les hybrides précoces atteindront les stades de maturité cireuse et pleine maturité (stations agrométéorologiques de Bazovets, Kneja, Glavinitsa, Pazardzhik, Plovdiv). Chez le tournesol, dans la plaine du Danube et dans les régions du sud, le stade de maturation interviendra.

En fin de première décade, une augmentation substantielle des températures est prévue ainsi qu'une progression accélérée des stades finaux de développement des cultures de plein champ tardives. Durant les deuxième et troisième décades, les conditions agrométéorologiques seront déterminées par un temps relativement sec et des températures autour et au-dessus des normes climatiques.

Pendant la seconde moitié d'août, une grande partie des cultures de plein champ tardives achèveront leur développement. Chez le tournesol, on observera la maturité technique de masse, et chez le soja – le stade de maturation. En fin de mois, la maturité cireuse prévaudra chez les hybrides de maïs mi-tardifs. Chez le riz, le stade de maturité laiteuse interviendra, et chez le coton – l'ouverture des capsules.

Durant la seconde moitié du mois, le déficit en humidité du sol pour les deuxièmes cultures s'accentuera et nécessitera des taux d'irrigation accrus. En de nombreux endroits des régions de grande culture, le manque d'humidité dans les couches supérieures du sol gênera la réalisation qualitative du labour profond et du travail du sol pré-semis des parcelles destinées aux semis de colza d'hiver. Les périodes agrotechniques de semis du colza débutent dans la troisième décade d'août.

En août, pour les variétés d'arbres fruitiers tardives, l'activité nuisible de la dernière génération de carpocapses ne doit pas être sous-estimée. Le temps relativement sec pendant la plupart des jours du mois sera une condition préalable à une augmentation des populations d'acariens. Dans les vignobles, il est nécessaire de surveiller l'apparition et la densité des larves de la troisième génération de l'eudémis. Les traitements phytosanitaires doivent être effectués pendant les heures fraîches de la journée avec des produits ayant un délai avant récolte approprié, en fonction de la période de maturation des cultures.

Source : NIMH